Verslag KNNV-Natuurvakantie Bükk & Hortobagy

7 -21 juni 2026



Foto Jan van der Veer



Farm Lator Foto: Theo Briggeman

Colofon:

Eindredactie: Marjanne van Esveld, Corrie Lesuis en Theo Briggeman
Foto voorzijde: Jan van der Veer

Natuurvereniging KNNV:

Postbus 310 3700 AH Zeist
E-Mail: bureau@knnv.nl
Telefoon: 06-83 50 46 11
Website: www.knnv.nl
e-mail secretaris: secretaris@knnv.nl.

Tekst:

Theo Briggeman, Willem Drok, Wankja Ferguson, GeertJan Herder, Erik Ketting, Dolf Logemann, Anna Maria van Paassen en Janny Resoort.

Foto's:

Theo Briggeman, Frans Duijm, Marjanne van Esveld, Wankja Ferguson, Erik Ketting, Dolf Logemann, Anna Maria van Paassen en Jan van der Veer.

Publicatiedatum:

10 oktober 2026

Camping:

Boerderij Lator
Rob en Barbara de Jong
Rozsavari ut 95
3425 Saly-Lator puszta
farmlator@hotmail.com
www.farmlator.hu

Periode natuurreis: 7-21 juni 2026

Bestuur:

Voorzitter:	GeertJan Herder
Penningmeester:	Marijke Levy
Excursieregelaar:	Dolf Logemann

Weersomstandigheden: 2 weken zonnig (tussen de 20 – 30 graden)

De 15 deelnemers:

Theo
Frans
Marjanne
GeertJan
Corrie
Jan
Willem
Dolf
Anna Maria
Erik
Anne
Janny
Jack
Wankja
Marijke

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 4
Inleiding /voorwoord 7
Beschrijving van het gebied in biotopen en soorten rijkdom 9
De omgeving 9
De steppen 10
De rivieren 12
De dorpen 13
De landschappen rondom het kampterrein 14
Planten 16
Inleiding 16
Werkwijze 16
Vogels 19
De vogels van NO-Hongarije 19
De vogels van 2026 nader beschouwd 21
De tuin van het Team Huisje en de Merlin App 26
Vlinders 27
Dagvlinders 27
Vlinderonderzoek 30
Nachtvlinders en hun ecologie 31
Bijen en bloemen 34
Insecten 35
Insecten, vliegend hert 35
Poppenroof 37
Reptielen en amfibieën 37
Soorten amfibieën en slangen 37
Hagedissen 38
Zoogdieren 41
Soorten zoogdieren 41
Vleermuizenonderzoek 41
Insecten 42
Overige soorten 42
Literatuur 44
Algemeen 44

Planten 44
Vogels 44
Dagvlinders 44
Bijen 45
Verslagen van de excursies 47
Wandelingen dichtbij Farm Lator 47
8 juni Latorpuzsta: kalkgraslanden en bossen 47
19 juni Omgeving Farm Lator 48
Cserepfalu 49
9 juni Schrale graslanden NO Cserepfalu 49
9 juni Valleiwandeling Cserepfalu 50
17 juni Tard en vallei bij Cserépfalu 51
18 juni Cserépfalu met vlindervallei 52
Búkkzserc 53
10 juni Kalkgraslanden achter Búkkzserc 53
14 juni Kalkgraslanden achter Búkkszerc 54
Kleine Hortobagy 54
11 juni Rondrit Kleine Hortobagy 54
20 juni Rondrit Kleine Hortobagy 55
Repashuta 56
12 juni Repashuta 56
Grote Hortobagy 57
10 juni Wandeling langs de Tisza 57
13 juni Visvijvers Hortobagy Halasto 57
15 juni Tiszadob, Tiszadam 58
19 juni Grote Hortobagy – 1 58
19 juni Grote Hortobagy - 2 59
Excursiegebied Grote Hortobagy - 2 59
Eger 60
14 juni Uitstapje naar Eger 60
Hor vallei 60
16 juni Noordelijke Horvallei 60
KisgyÖr 61
16 juni Graslanden Kisgyör 61
18 juni Beekdal bij Kisgyör 61

20 juni Beekdal van Kisgyör ... 63
Aggtelek ... 63
18 juni Aggtelek ... 63
Waarnemingen ... 65
Planten ... 65
Totaallijst waargenomen planten ... 65
Waarnemingen planten per gebied - gebiedskaartjes ... 75
Gebied: Latorpuszta rondje vanaf de camping. ... 75
Gebied: Cserepfalu grasland ... 79
Gebied: Cserepfalu dal vanaf bezoekerscentrum ... 80
Gebied: Bukkzserc ... 82
Gebied: Kleine Hortobagy ... 86
Gebied: Repashuta ... 88
Gebied: Hortobagy visvijvers ... 93
Gebied: Bukkzserc ... 94
Gebied: Tiszadob ... 95
Gebied: Cserepfalu dal vanaf bezoekerscentrum ... 97
Gebied: Kisgyor graslanden ... 98
Gebied: Karstbos ... 100
Gebied: Tard en dal bij bezoekerscentrum ... 104
Gebied: Kiskyor beekdal ... 106
Gebied: Rondje vanaf camping ... 109
Gebied: Kisgyor beekdal ... 110
Vogels ... 111
Vlinders ... 114
Tabel dagvlinders Hongarije 2008-2026 ... 114
Nachtvlinders 2026 ... 116
Insecten ... 118
Libellen ... 120
Vliegen en muggen ... 121
Wantsen ... 121
Sprinkhanen en krekels ... 121
Kevers ... 122
Zoogdieren overig ... 123

Inleiding /voorwoord

Tekst: GeertJan Herder

Hongarije dus. Voor mij de tweede keer dat ik me heb ingeschreven voor een AKC-kamp in Hongarije. De eerste poging werd gecancelled wegens te weinig deelnemers. Dit kamp is echter snel vol. Totdat er inschrijvers afvallen en er alsnog geïnteresseerden mee kunnen. En dan zijn er 15 te verwelkomen op Farm Lator. Aan het eind van een weg aan de rand van het Nationaal Park Bükk. Een plekje zoeken in de natuurtuin rondom de 'Farm' is een droom voor iedere kampeerder! De niet-kampeerders hebben een onderkomen aan de andere kant van de weg in een bosrijke omgeving op enkele minuten afstand. Alle gerief aanwezig; kamers met sanitair of op de gang + een keukentje waar al gauw gezamenlijke maaltijden worden bereid.
Nog een droom: een heerlijke Hongaarse maaltijd als welkom. En mooi op tijd klaar voor de eerste Sjoc, excuus Kring van dit kamp. De bibliotheek is een prima plek voor kring, overleg en determinatie. Het voorstelrondje maakt duidelijk dat er specialisten en generalisten zijn en allen zijn zeer benieuwd wat de omgeving ons biedt. Daar heeft Rob wel een antwoord op. Maar eerst geeft Dolf een inleiding over de platentectoniek en wat daarvan op de kaart en in het landschap te vinden is. Leuk weetje: we komen hier zoutminnende flora tegen. Dat doet de Groningers goed!! Rob spitst e.e.a. toe op flora en fauna m.n. vogels en vlinders en meldt dat alle boeken uit de bibliotheek gebruikt mogen worden. Daar zal driftig gebruik van worden gemaakt, in Ned. namelijk niet voorhanden. Het duo Dolf en Rob zullen ons vele mooie excursies voorschotelen. Dankjewel!
Het is 'vroeg' donker, 3 kwartier eerder dan in Ned., maar ook MET, dus je hoeft je horloge niet te verzetten. De eerste excursie begint bij uitzondering om 10 uur en voert ons te voet (de enige op enkele privé-initiatieven na!) door het dal, tegen de oosthelling op en geeft ons een goede indruk van de flora en fauna van de kampomgeving. Het is warm. En dat zal zo blijven. Voor alle volgende excursies moeten we redelijke tot flinke afstanden rijden. De langste nam anderhalf uur enkele reis. Door mooie berglandschappen, bijzondere dorpjes, oude boerderijen met waterput, uitgestrekt cultuurlandschap met stukjes puszta en af en toe een pontje over de Tisza (als er op de telefoon gereageerd wordt!). Kortom: Búkk en Hortobagy. De excursieverslagen en de waarnemingen staan vol met mooie en bijzondere vondsten: veel vlindersoorten, een lamsoor, arenden en valken, minieme bijtjes en levende fossielen.
De rij-afstanden werden door enkelen wel lang gevonden en dan is een wandeling in de omgeving een fijn alternatief. Maar rond onze locatie werd de wandeling al gauw een avontuurlijke.
In de omgeving zijn supermarkten en andere winkels snel bereikbaar en er kan overal met betaalkaarten worden afgerekend tot in het kleinste winkeltje onderweg aan toe. Pinautomaten zijn ook goed te vinden. Overigens schrik je van de getallen op de kassa: 1€ = 357,23 HUF (forint).
Op de vrije zondag hebben verschillende deelnemers het historische Eger bezocht. De waardering was enthousiast tot minder enthousiast en het Stierenbloed valt wat tegen. (De wijn bij het eten vond men lekkerder!).
De sfeer in het kamp was goed en zeer coöperatief en daar wil ik de deelnemers hartelijk voor bedanken. De 5 heerlijke gezamenlijke Hongaarse maaltijden hebben daar zeker een positieve rol in gespeeld. Hulde aan Barbara en haar staf.
Ik heb genoten in de Bükkkamp op Farm Lator, maar er moet mij nog een ding van het hart: het gebruik van de wcrolhouder. Elk bezoek werd een hersteloperatie. Hierbij de handleiding.





Niet zo ……. maar zo! a.j.b. Groet, GeertJan



De bibliotheek Foto Marjanne van Esveld

Beschrijving van het gebied in biotopen en soorten rijkdom

Tekst en foto's: Dolf Logemann

Het Bükk-gebergte

De omgeving

Ons verblijf in Farm Lator ligt aan de voet van het Bükk-gebergte in Noord-Hongarije. Het Bükk-gebergte is een middelgebergte, 432 km^2 groot. De hoogste top is 959 m hoog: de Istállóskő. Aangezien veel andere toppen ook in de orde van 900 tot 950 m hoog zijn, is er op de hoogste delen min of meer sprake van twee hoogvlaktes, elk met een golvend oppervlak en doorsneden door de Hór-vallei. De grootste hoogvlakte ligt in het noorden richting de Slowaakse grens; de andere hoogvlakte in zuidoostelijke richting nabij Lator en Kisgyör. Uiteraard zijn de flanken van de beide hoogvlaktes veel steiler en bebost.

Op de kaart lijkt het Bükk-gebergte op een uitloper van de Karpaten, maar de Bükk is veel ouder dan dat laatste gebergte. Het ontstond circa 75 miljoen jaar geleden door vulkanisme en aardplooiing in de zeebodem op de Afrikaanse plaat. Plaattektoniek is de reden dat deze aardschol in de loop van miljoenen jaren naar het noorden schoof, met het Bükk-gebergte op de rand. De plaat botste vervolgens 35 miljoen jaar geleden tegen de Europese plaat. Daarbij ontstonden zowel de Alpen als ook de Karpaten en de Dinarische Alpen. Een vreemde gedachte dat het Bükk-gebergte ooit in Afrika is gevormd!




De noordelijke hoogvlakte in het Bükk-gebergte, met o.a. Iris siberica

De Bükk is nu een middelgebergte. Uit het verleden bestaat de ondergrond voor een groot deel uit kalkbodems, maar er zijn ook vulkanische afzettingen. Door het grootschalig voorkomen van kalk in de ondergrond tref je op veel plaatsen typische karstverschijnselen aan: enorme zinkgaten (dolines) naast kalksteengrotten, kalkgraslanden, tufsteenformaties e.d. Vrijwel het gehele gebied is Nationaal Park, Natura 2000-gebied én ook Unesco Geopark. Van het Nationaal Park is 94 procent bebost. Een deel van dat bos is oud en wordt niet meer beheerd. 40 % is ouder dan 80 jaar en meer dan 1.000 ha aan bossen is ouder dan 150 jaar. De oudere bossen zijn geschikt leefgebied voor bijzondere bossoorten als oeraluil en witrugspecht.

Globaal telt het bos in de Bükk drie lagen: eikenbos onderaan, dan een tussenlaag van haagbeukenbos en boven de 400 m beukenbos, vaak op rotsige grond. Botanisch interessant zijn vooral de bossen op kalkbodems. Daarnaast zijn er in het gebied op veel plaatsen bloemrijke weiden en hooilanden: kalkgraslanden op kalkbodems en heischrale graslanden op vulkanische bodems. Hoewel droogte en achterstallig beheer hun tol eisen, zijn de graslanden nog vol interessante planten, vlinders en andere insecten. De soortensamenstelling is hier vooral door het nabije Karpaten-gebergte beïnvloed. Behalve oeraluil en witrugspecht komen in het gebied ook soorten voor als oehoe, keizersarend, slangenarend, schreeuwarend, dwerguil, withalsvliegenvanger, taigaboomkruiper en kleine vliegenvanger. Van de zoogdieren zijn edelhert, moeflon, wild zwijn, wilde kat en lynx vertegenwoordigd; recent is ook hier de wolf weer teruggekeerd.





De steppen

Het Bükk-gebergte vormt de noordelijke rand van de grote Hongaarse laagvlakte. Deze vlakte strekt zich ook over de grenzen van Hongarije tot in het oosten van Oostenrijk, het westen van Roemenië en delen van Serv:e en Kroatië uit. Naar de vroegere bewoners van het gebied, wordt deze laagvlakte ook wel de Panonische laagvlakte genoemd. Ze vormt plantengeografisch zelfs een apart district, met zowel midden-europese en mediterrane invloeden als ook typische steppenorganismen uit de steppen van Oekraïne, Zuid-Rusland en Anatolië, zoals bijvoorbeeld de steppenvorkstaartplevier. Het Hongaarse woord voor deze steppen is ’puszta’, wat ’vlakte’ betekent.



Hoogtekaart van Hongarije en omringende landen. Zichtbaar zijn de grote Hongaarse of Panonische laagvlakte en, bij de rode stip, Farm Lator en het Bükk-gebergte

Van oorsprong was deze vlakte een grote binnenzee, die door het onstaan van de beide Alpen en de Karpaten afgesneden was van de vroegere Thetyszee (waarvan de huidige Midellandse Zee een restant is). Door de oorsprong als zeebodem is het landschap grotendeels vlak én zout. Het zout en de kalkondergrond werd tussen de 310 en 150 miljoen jaar geleden op de zeebodem van de Thetyszee gevormd. Het zout lost op door neerslag en komt in de zomer door verdamping en capillaire werking omhoog. Op plekken zonder intensieve landbouw tref je veel zouttolerante planten aan als zeealsem, schorrekruid, spiesbladmelde, heemst en zelfs zeekraal, vaak als panonische ondersoort. Het gebied is door zout en zeer hete zomers van nature vrijwel boomloos. Door rondtrekkende kuddes schapen en runderen (traditionele grijze longhorns) heeft bosopslag hier sowieso weinig kans. In warmere perioden tussen de ijstijden in is een deel van de zoute steppen overdekt geraakt met löss. Dat zijn de gebieden die nu in agrarisch gebruik zijn, vooral voor graan en zonnebloemen.

Van de enorme steppen zijn nog twee grotere delen bewaard gebleven: de Kleine Hortobágy en de Grote Hortobágy (spreek uit: Hortobaadzj). Samen zijn deze gebieden ruim 800 km^2 [1]groot en inclusief beschermde randgebieden 1.051 km^2. De Kleine Hortobägy maakt deel uit van het Bükk Nationaal Park, de Grote is een zelfstandig nationaal park met een eigen bestuur en infocentrum in het gelijknamige dorp midden op de poesta.

Grote delen van beide vlaktes zijn gortdroog, maar opmerkelijk genoeg zijn er ook heel natte delen. In kleine laagtes kunnen plassen met rietzomen ontstaan. Maar in de Grote Hortobágy liggen ook complexen van (inmiddels verlaten) visvijvers. De grootste liggen bij het gehucht Holostó, net ten westen van het dorp Hortobágy. Dit is een enorm complex van waterpartijen, rietzomen en slikkige gebieden, enorm rijk aan watervogels, reigerachtigen, steltlopers en diverse eend- en fuutachtigen. In deze visvijvers komen maar liefst acht soorten reigers voor, dwergaalscholvers, zeearenden, grote karekieten, witoogeenden en steltkluten. De droge delen zijn het domein van de kleine klapekster, bijeneter, roodpootvalk, scharrelaar, grauwe gors en diverse soorten roofvogels. De beide steppengebieden zijn misschien op het eerste gezicht kaal en saai, maar voor vogelaars is het een paradijs!

[1] Vergelijk hiermee de Noordoostpolder: deze is ongeveer 400 km^2 groot.



De Grote Hortobágy

De rivieren

Door de laagvlakte lopen enkele grotere en kleine rivieren. Met voorsprong de grootste is de Tisza. Deze heeft zijn oorsprong in het Zemplén-gebergte, nabij de stad Tokaj. Het is een typische laaglandrivier, die traag door het landschap richting de Donau stroomt. Hoewel sommige brochures suggereren dat deze rivier ‘ongerept’’ is, is het tegendeel waar. In de rivier bevinden zich stuwen, vistrappen en aan weerszijden liggen zware dijken. Uiterwaarden ontbreken (althans op de door ons bezochte delen). Toch zijn de natuurwaarden hoog. Er ligt een aanzienlijke hoeveelheid zachthoutooibos en ook hardhoutooibos ontbreekt niet (wij zagen deze alleen binnendijks, dus buiten het bereik van de rivier). De meest waardevolle gedeelten zijn echter de diverse afgesneden meanders en de grote waterbekkens tussen Poroszló en Tiszafüred. Deze zijn het domein van de witwangstern, diverse reigerachtigen, grote karekiet en de zwarte ooievaar. De dijken vormen een goed vlinderbiotoop.



Een afgedamde arm van de Tisza

De dorpen

De dorpen in dit deel van Hongarije liggen vrijwel steeds als een langgerekt lint langs de hoofdweg. De eenvoudige huizen zijn vaak vierkant of langwerpig, één bouwlaag met een puntvormig dak of een kleine nok. En altijd met een laag muurtje en een hek aan de voorzijde van het erf. Kenmerkend zijn de vele ooievaarsnesten op de telefoonpalen. De bomen in de dorpen zijn ook de biotoop van de Syrische bonte specht.



Ooievaarsnesten in Tiszabábolna

De landschappen rondom het kampterrein

Tekst Willem Drok

Je kunt Hongarije zien als een platte pannenkoek, omringd door bergen. De pannenkoek is dan de puszta waarin de Donau stroomt en de Tisza als zijrivier daarvan.

Farm Lator ligt aan de voet van het Bükk-gebergte, een voorgebergte van de Westelijke Karpaten. Dit gebergte is betrekkelijk laag (tot zo'n 900 m boven de zeespiegel) en bestaat uit kalksedimenten, dooraderd met vulkanische afzettingen.

De vlakte is een uitloper van de steppe die zich oostwaarts uitstrekt door Oekraïne, Rusland, en verder. De puszta ligt in de regenschaduw van de omliggende gebergten (de Karpaten, de Alpen en de gebergten van de Balkan), waardoor daar relatief weinig regen valt. Mede door deze droogte heeft de vlakte een continentaal klimaat. Farm Lator ligt dicht bij de Tisza, die in de Karpaten ontspringt en door de puszta in zuidelijke richting naar de Donau stroomt.

In het Bükk-gebergte vinden we vooral bos, met daarin kalkgraslanden en beekdalen.

Rondom de camping en op andere laaggelegen delen van de Bükk bestaat het bos uit eiken en haagbeuken, wanneer het tenminste niet overgenomen is door de ook hier woekerende robinia. Die eiken zijn wat minder vertrouwd: naast zomer- en wintereik vooral moseik en donzige eik, warmte minnende soorten die in Nederland (nog) niet in het wild groeien. Kenmerkend is ook de Tartaarse esdoorn, naast bekende struiken als kardinaalsmuts en veldesdoorn. Kom je wat hoger in het gebergte, dan bestaat het bos uit hoge moseiken met daaronder haagbeuk. Nog hoger doet de beuk zijn intrede, en groeien er veel soorten die we ook kennen uit de kalkrijke beukenbossen in Duitsland. Daarbij moet je wel zeggen dat we van de soortenrijkdom van de bossen maar de helft gezien hebben; dit soort bossen heeft immers een rijke voorjaarsflora van anemonen, helmbloemen, sneeuwklokjes, hyacinten en nog veel meer die we geheel gemist hebben.

Kalkgraslanden vinden we op de vlakke plateaus in de bergen. Door het wegvallen van begrazing zijn veel van deze weides aan het dichtgroeien met sleedoorn, maar de flora en de fauna zijn nog bijzonder rijk. Veel soorten die er voorkomen kennen we ook van de kalkgraslanden in Zuid-Limburg of de Eifel, maar er zijn ook zuidelijke (submediterrane) en oostelijke (pontische) soorten. Fraaie voorbeelden van deze laatste zijn het Vedergras (Stipa pennata) en de Gele vlas, en bij de vlinders: de Kardinaalsmantel en de Lathyrus- en de Spireazwever.

De beekdalen zijn eerder periodiek vochtig dan echt nat, al kan dat beeld vertekend zijn omdat we dit jaar een erg droog jaar hadden. Kenmerkende en fraaie planten zijn de niet-klimmende bosrank Clematis integrifolia, de glanzende ruit, het Zaagblad en de Siberische lis.

Ook in de vlakte vinden we verschillende landschappen. De ondergrond van de vlakte bestaat uit oude mariene klei, waarop wisselende diktes zand en löss zijn afgezet. Van oorsprong overstroomde de vlakte in de winter langdurig, maar door de bedijking van de rivieren is daar een eind aan gekomen. Doordat de verdamping op jaarbasis groter is dan de neerslag, komt zout uit de ondergrond naar boven; waar de afzettingen boven op de klei dik genoeg zijn, blijft de bodem zoet en kan landbouw plaatsvinden. Het landschap bestaat dan ook grotendeels uit enorme percelen graan, zonnebloemen, koolzaad en andere gewassen. Daartussen liggen -ook uitgestrekte- natuurgebieden: schrale graslanden met hier en daar andere begroeiing: rietvelden, bosjes, ruigtes. Deze worden door extensieve beweiding onderhouden. Van tijd tot tijd duiken hierin zilte soorten op

zoals lamsoor en zeegerst – wel andere soorten dan wij kennen maar toch herkenbaar. Ook zijn hier veel vogels te spotten, van kievit en kraanvogel tot kleine klapekster en keizerarend. Wanneer deze velden in de herfst plas-dras staan, zijn zij van groot belang voor doortrekkers.

In de vlakte is een groot complex visvijvers aangelegd. Naast visteelt hebben deze een grote waarde voor water- en moerasvogels. De aanblik van honderden hectares bloeiende watergentiaan met daarboven witwangsterns en dwergaalscholvers blijft mij bij.

De rivier de Tisza is een belangrijke vormgeven van het landschap. Langs de rivier liggen stroken hardhoutooibos, waarin -naast bomen als esdoorns, essen, iepen, eiken, abelen- ook veel invasieve exoten groeien: valse indigo, robinia, hemelboom. Op een verlaten weide tussen de bossen vonden we o.a. genadekruid. Een oude arm van de rivier leverde een zeer idyllisch plaatje op van zwarte ooievaars, ralreigers en kwakken op een dode boom in de oever.

Kortom, een zeer gevarieerd en rijk gebied!

Planten

Tekst: Erik Ketting

Inleiding

Tijdens dit KNNV-kamp in Hongarije hebben we het Búkkgebergte bezocht, een karstgebergte dat grotendeels bestaat uit kalksteen en dolomiet met lokaal ook afgewisseld met vulkanische gesteenten. Daarnaast hebben we ook de ooibossen en overstromingsvlakten langs de Tisza bezocht en de Hongaarse steppe, met uitgestrekte grasvlakten afgewisseld met moerassen en zoutvlakten. In deze gebieden hebben we afwisselende rijke flora aangetroffen waarvan u hieronder het verslag aantreft. In totaal hebben we tijdens het kamp 412 plantensoorten genoteerd.

Werkwijze

De plantenwaarnemingen zijn vastgelegd met de apps Observation en Obsidentify. De waarnemingen zijn daarna gecontroleerd, gebruikmakend van de Hongaarse flora, Iconographia Florae Partis Austro-Orientalis Europae Centralis, de Bildatlas der Farn- und Blutenpflanzen Deutschlands en Die Flora von Deutschland. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van 2 mooie Hongaarse websites, PADAPT Pannonian Database of Plant Traits (https://padapt.eu/en) en Vascular plants of Hungary online database (https://floraatlasz.uni-sopron.hu/) Deze websites geven informatie over de verspreiding van plantensoorten over Hongarije en informatie over de ecologie en herkenning. Om de beeldherkenning van Obsidentify te toetsen hebben daarnaast ook de app PlantNet gebruikt.


In dit verslag is een totaallijst opgenomen met alle gevonden planten daarnaast is er een lijst met gevonden soorten per dag per gebied gemaakt met bijbehorend kaartje. De lijsten zijn gesorteerd op familie en daarna op wetenschappelijke naam. De soortnamen zijn in het Nederlands voor zover er een Nederlandse naam bekend is, anders wordt de wetenschappelijk naam vermeld. In de laatste kolom van de lijsten per gebied is een kolom opgenomen met hypelinks, als je deze hyperlink kopieert en in een browser plakt krijg je de waarneming in Observation.org te zien, meestal met bijbehorende foto’s.



Waaiend vedergras

Foto: Theo Briggeman

Foto’s: Erik Ketting

 Beklierde kogeldistel	 Campanula Siberica
 Chamaecystisus alba	 Genadekruid
 Hongaarse Wikke	 Grote Muggenorchis
 Kleine Pimpernel	 Kuifhyacint


 Limonium Gmelini	 Melampyrum Barbatum
 Nonea Pulla	 Purperen klaver
 Tartaarse Esdoorn	 Stinkende Balote
 Walstro-bremraap	 Veronica spicata Subsp. orchidea

Vogels

Tekst: Theo Briggeman

De vogels van NO-Hongarije

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal van de vogelsoorten die door de deelnemers aan de natuurvakantie in 2026 zijn gezien en aangevuld met waargenomen soorten tijdens KNNV reizen in de jaren 2008, 2010, 2013, 2016 en 2021. We staan stil bij kenmerkende soorten voor dit deel van Hongarije en putten voor een paar soorten uit de trendmatige ontwikkelingen zoals weergegeven in de Vogelatlas van Hongarije (2022), de Europese Broedvogelatlas (2020), de verslagen van de KNNV reizen in het verleden, en wat artikelen uit diverse vakbladen. Tijdens de KNNV-reizen zijn doorgaans alleen de waargenomen soorten genoteerd, aantallen zijn meestal niet in kaart gebracht. Dat brengt met zich mee dat er daardoor hooguit iets is te zeggen over de verschijningsontwikkeling van de soorten. Tijdens de reis van 2026 zijn door één waarnemer ook de aantallen per soort digitaal ingevoerd. Via observation.org is daardoor ook na te gaan op welke plek deze soortaantallen zijn waargenomen.





Tot aan 2026 zijn de waarnemingen via dagelijks bijgehouden en ingeleverde notities op schrift gesteld, beter bekend als de ‘groene briefjes’. In 2026 hebben sommige deelnemers aan de natuurvakantie van de KNNV hun waarnemingen digitaal ingevoerd in de portal observation.org. Enkele andere deelnemers hebben hun waarnemingen incidenteel digitaal ingevoerd en/of bij de soortcoördinatoren ingeleverd. Dat is evenwel niet structureel gebeurd. De in de observation.org app ingevoerde waarnemingen worden gevalideerd, de incidentele waarnemingen niet. Tijdens deze natuurvakantie is geen gebruik meer gemaakt van de groene briefjes.

De deelnemers aan de reis van 2026 hebben voor hun waarnemingen ook in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van de Merlin app, waarmee op grond van geluiden vogelsoorten herkend kunnen worden. Ofschoon de app nog kinderziektes kent, leidt dit inmiddels tot een behoorlijke kwaliteitsverbetering van de opgegeven waarnemingen.

De waarnemingen in de jaren 2010, 2013, 2016 en 2021 zijn verwerkt in de KNNV – verslagen van de AKC van deze jaren en van een korte toelichting voorzien. Op basis van deze waarnemingen en verslagen is een overzicht gemaakt van de in de jaren 2010, 2012, 2013, 2024 en 2025 waargenomen soorten (zie tabel). Het aantal waargenomen soorten varieerde van 89 in 2016 tot 166 in 2026. Een heel behoorlijk aantal soorten. Het lage aantal van 2016 zal zeker te maken hebben met het feit dat dit een reis is geweest die vooral gericht was op planten- en dagvlinderwaarnemingen. Dat leidde ertoe dat er vooral specialisten op deze twee vakgebieden aan deze reis hebben deelgenomen en in mindere mate door vogelspecialisten. De reis in 2021 vond in september plaats, waardoor de soortensamenstelling op vogelgebied anders was dan in andere jaren. Met name de zomergasten waren al goeddeels naar hun winterkwartieren vertrokken. Tegelijkertijd was de trek al op gang gekomen, hetgeen tot een aantal soorten leidden die alleen in deze periode zijn te zien.

De kennis en de ervaring van de deelnemers is uiteraard ook van belang bij de behoordeling van de kwaliteit van de waarnemingen. In 2026 werden twee dagexcursies begeleid door een gids, Rob de Jong, een zeer ervaren vogelaar. Van KNNV-zijde namen vijf deelnemers met een gedegen vogelkennis aan deze natuurvakantie deel. Twee van hen voerden hun waarnemingen dagelijks digitaal in, drie andere voerden hun waarnemingen onregelmatig digitaal in c.q. leverden die na afloop van de reis bij de soortcoördinator in.



Schreeuwarend
Foto: Frans Duijm

De vogels van 2026 nader beschouwd

Hongarije telt in totaal 420 vogelsoorten, waarvan er 210 soorten regelmatig in het land broeden. Tijdens ons verblijf hebben we er 165 soorten waargenomen. Het hoogste aantal in de zes jaren waarin de KNNV het gebied bezocht.

NO Hongarije is rijk aan roofvogels. In 2026 werden er 17 soorten waargenomen. Door de jaren heen werden er 22 soorten gezien. Daarvan springen de oostelijke keizerarend, de arendbuizerd, de sakervalk en de roodpootvalk direct in het oog. De oostelijke keizerarend herbergt in Hongarije een populatie van 230-240 broedparen. In Europa broeden er 1300-1900 paar. Naast deze arend broedt er op het Iberische schiereiland nog een soort: de Spaanse keizerarend (400 broedparen). Op KNNV - reizen naar de Extremadura wordt deze soort vaak waargenomen. Onder leiding van Rob de Jong bezochten we op 11 juni een paartje van de oostelijke keizerarend in het Borsodi-Mezoseg gebied (N2000) en genoten we met de telescoop van een nest met één jong. Het eerste paar van de keizerarend werd in 1990 ontdekt. De Hongaarse populatie groeide in vijf jaar tijd van 150-160 paar in 2013 naar 230-240 paar in 2018. Opvallend was dat de oostelijke keizerarend van habitat veranderde: van de bergen/heuvels naar het laagland. Tijdens de KNNV-reizen werd de keizerarend alleen in 2013 niet gezien.

De arendbuizerd heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Pas in 1992 werd het eerste broedpaar vastgesteld. De populatie is nu ca 20 paar groot en is daarmee de grootste bronpopulatie van Oost-Europa. Tot nu toe was deze soort nog niet eerder in KNNV verband waargenomen.

Opmerkelijk was ook de waarneming van een schreeuwarend, die ook tijdens de KNNV-reizen van 2010 en 2013 werd gezien.



Bijna elk dorp heeft een ooievaarsnest.
Foto: Theo Briggeman

Van de uilen zagen we het steenuiltje het meest, vaak op schuren en in dorpen. Volgens de Vogelatlas is de steenuil wijd verspreid, door heel het land. Bij Farm Lator deed dit kleine uiltje enkele keren roepend van zich horen. Dat gold ook voor de bosuil, die regelmatig was te horen, onder andere bij Farm Lator. In de kleine Hortobagy namen we in een bosje waar een kolonie roodpootvalken was gevestigd ook vijf jonge ransuilen waar. De takkelingen waren al vrij groot en goed benaderbaar. Ook de oehoe werd gespot, onder andere bij een steengroeve. Op eerdere reizen werd ook de oeraluil en de velduil gemeld. De oeraluil werd na de reis van 2010 niet meer gezien.



Jonge ransuil
Foto: Theo Briggeman

Op de excursie met Rob de Jong op 11 juni aanschouwden we ook een paartje sakervalken met een nest in een hoogspanningsmast. Ook deze soort doet het goed in Hongarije (waren en in de jaren ’50 nog 28 broedparen, nu zijn dat er rond de 175 paar). Ze broeden doorgaans in het laagland, vaak op pylonnen van electriciteitpalen.

De roodpootvalk broedt in kolonievorm, vaak samen met roeken. Ze broeden tegenwoordig vaak in handmatig vervaardigde nestkasten. De soort komt vooral in laagland voor, met name in de puszta. Het aantal broedparen daalde tot begin jaren 2000 tot 600 paar, maar door bescherming-maatregelen verdubbelde dit aantal.

In de natte gebieden zagen we vaak bruine kiekendieven, die ook wel op akkerland werden gespot. Op dit habitat zagen we met enige regelmaat ook grauwe kiekendieven. De meest algemene roofvogels in ons verblijfsgebied waren de buizerd en torenvalk.

Bekend is het gebied natuurlijk ook vanwege zijn enorme hoeveelheden kraanvogels, die hier in de herfst pleisteren. In voorjaar en zomer blijven hier circa 20 jongere, niet broedrijpe, kraanvogels die niet met de adulte vogels wegtrekken, de zgn. “hangjongeren”. Bij bezoeken aan de poesta troffen wij deze vogels regelmatig aan.

Kenmerkende soorten zijn natuurlijk ook de bijeneter, de scharrelaar en hop, die regelmatig ook op telefoondraden zijn te bewonderen. De bijeneter was ook goed te zien bij zijn broedkolonies, vaak in afgravingen, aanvliegend met insecten in de bek. Alle drie de soorten zijn zomergasten in Hongarije, en nemen in aantal toe. Dat geldt zeker voor de wielewaal, ook een zomergast. Daar gaat het vooral hoorbaar erg goed mee. De dag begon vaak al in onze tuin met de bekende dudeljo -zang van deze

gele Afrikaanse gast. Op vele plaatsen hoorden we de wielewaal gedurende onze vakantie. Volgens de Vogelatlas is er sprake van zo'n 143.000 tot 145.00 uur broedpaar, verspreid over het hele land.

Elk zichzelf respecterend dorp herbergt ook een of meer ooievaarsechtparen, nestelend op ouderwetse telefoonpalen. Sommige dorpen hebben tientallen nesten. Een buitengewoon beeld, dat duidt op rijke foerageermogelijkheden.



Overzomerende "hangjongeren"
Hortobagy 25 juli 2016
Foto: Theo Briggeman

Als je je spechtsoorten eens wilt ophalen, is NO Hongarije een bezoek waard. Al bij Farm Lator hoorden en zagen we dagelijks grote bonte specht, middelste bonte specht, kleine bonte specht, groene specht en grijskopspecht. Tijdens onze omzwervingen voegden we daar zwarte specht en Syrische bonte specht aan toe. Voor 2010 werd de witrugspecht gemeld. Grote bonte specht en middelste bonte specht zagen we vrijwel dagelijks op de voederplank bij het vakantiehuisje van Farm Lator. De syrische bonte specht komt vooral in dorpen en tuinen voor en is wijd verbeid over het hele land. Toch zagen wij deze op de grote bonte specht lijkende soort maar een paar keer. Waarschijnlijk hebben we hem vanwege deze gelijkenis wel eens over het hoofd gezien. De verwante draaihals tot slot vertoonde zich regelmatig. Al op onze eerste wandeling vlogen er twee voor ons uit over de weg nabij Farm Lator.



Bijeneter
Foto: Frans Duijm

De rijkdom aan spechtensoorten deed denken aan het oerbos van Bialowieza op de grens van Polen met Wit-Rusland dat soortgelijke aantallen spechtensoorten telt.

De gierzwaluw komt in Hongarije alleen in de grotere steden voor. Op het platteland werd de soort door ons niet waargenomen. De Vogelatlas bevestigt dat beeld. De deelnemers aan de reis zagen de gierzwaluw op de heen- en terugreis alleen in steden als Boedapest en Sopron. De Hongaarse populatie wordt geschat op 3000-5000 paar. Er lijkt als gevolg van renovatie van gebouwen (duurzaamheidsmaatregelen) zelfs sprake van een afnemende broedpopulatie. In de vogelatlas wordt overigens ook opgemerkt dat de gierzwaluw niet systematisch is geteld. De soort werd op 2021 na (van september, als de gierzwaluw is weggetrokken) wel op alle reizen waargenomen. Waar dat precies was, is niet uit de gegevens te destilleren.

De ringmus daarentegen is een van de meest voorkomende broedvogels van Hongarije. Kom daar maar eens om in Nederland! We zagen deze mussensoort bijvoorbeeld elke dag in de tuin van Team Huisje c.q. de andere tuin van Farm Lator. Ook de huismus doet het behoorlijk goed.



De ringmus is van één van de algemeenste broedvogelsoorten.
Foto: Theo Briggeman

Water- en moerasvogels zijn vooral te vinden rond de rivier de Tisza en de visvijvers van de Hortobagy. Bij een zijarm van de Tisza troffen we onder andere grote aantallen grote karekieten, die je bij ons in Nederland nog maar in heel kleine aantallen ziet. Ook andere rietvogels zoals kleine karekiet en rietzanger zijn in hier in grote aantallen te horen en minder te zien. Opvallende waarneming was een zwartkoprietzanger, een zomergast die overwintert in ZO-Europa en noordelijk Afrika. De vogel broedt in overjarig riet. Volgens de vogelatlas telt het land zo'n 2500-3500 paar, en gaat de soort waarschijnlijk achteruit. Mooie waarneming dus. De bruine kiekendief broedt hier in flinke aantallen. Aan de oever van deze rivierarm zagen we een groepje buidelmezen met rietpluis bezig hun ronde nest te bouwen. Nachtegaal, baardman en kwak completeerden het beeld.



De rietzanger is een algemene verschijning in de Hortobagy.
Foto: Theo Briggeman

Bij de visvijvers van de Hortobagy werden we getrakteerd op reigerachtigen als grote en kleine zilverreiger, ralreiger, koereiger, purperreiger, blauwe reiger, lepelaar en roerdomp. Op de slikranden en weilanden eromheen foerageerden grutto, kluut, steltkluut, bergeend, zwarte ruiter, wulp en kleine plevier. Een groep grauwe ganzen bevatte enkele vogels met gele halsbanden, deel uitmakend van een Oost-Europees ringproject. De afgelezen halsbanden zijn aan de betrokken wetenschappers doorgegeven. Op de visvijvers zelf foerageerden grote groepen aalscholvers, dwergaalscholvers, futen en witwangsterns. Witoogeend, smient en wilde eend vertegenwoordigden de eenden - soorten. In de trektijd zagen onze KNNV-collega's op eerdere reizen veel meer soorten zoals slobeend, zomertaling, wintertaling en tafeleend.



Scharrelaar
Foto: Frans Duijm

De tuin van het Team Huisje en de Merlin App

Zeven vakantiegangers verbleven tijdens onze natuurvakantie niet op de camping van Farm Lator maar even verder op het terrein in een vakantiehuisje. Rond het huisje lag een flinke tuin, grenzend aan een loofbos van het Búkkgebergte. Niet alleen sliepen we hier, er werd ook ontbeten en ’s avonds aten we er vaak ons avondmaal. Gelukkig was dat niet ons Laatste Avondmaal!

Al gauw werd dit gezelschap omgedoopt tot het “Team Huisje” dat samen een zeer genoeglijke vakantie doormaakte. ’s Ochtends stond ik hier vaak als eerste om half zeven op, downloadde mijn krantje op mijn IPad en legde vervolgens mijn IPhone op de tuintafel om de vogelgeluiden app van Merlin aan te zetten. Dat heb ik zo’n beetje de hele vakantie volgehouden met als gevolg dat we een aardig overzicht hadden van de vogelbevolking van “onze” tuin. Zat ik eerst nog alleen te kijken naar de al vlug met vogelnamen vollopende app, al snel kreeg ik elke ochtend gezelschap van een of meerdere teamgenoten en na verloop van tijd kwamen ook de camping-gangers van de overkant meeluisteren c.q. kijken. Dat leverde een imposante lijst van al dan niet nieuwe soorten op, zeker ook omdat er aan het uiteinde van de tuin een voedertafel met kijkscherm was geposteerd, waar menige vogel elke dag kwam mee- eten. Na een kleine twee weken hadden we een aardig beeld van de vogelbevolking, met voor de meesten van ons wel een of meerdere nieuwe soorten. Want wat te denken van de withalsvliegenvanger, de appelvink, de steenuil, middelste bonte specht, kleine bonte specht, tortelduif, nachtegaal, glanskop, bosuil, sperwer, putter of wielewaal? Ofschoon de Merlin App nog wel eens kinderziektes vertoont, is dat inmiddels na een aantal jaren gebruikt te zijn, al veel minder het geval en levert de app een behoorlijke indruk van de plaatselijke vogelbevolking op. Het Team Huisje heeft ervan genoten! Aangevuld met vliegende herten, springkikkers en zandhagedissen maakte deze tuin met behulp van deze app een onuitwisbare indruk.



Team huisje aan het ontbijt
Foto: Anna Maria van Paassen

Vlinders

Dagvlinders

Tekst: Theo Briggeman

Het Karpatenbekken, waarvan het Bükkgebergte deel uitmaakt, was na de ijstijden een ontmoetingsplaats voor vlinders uit verschillende zoögeografische regio's. Nadat de ijskappen zich ongeveer 10.000 jaar geleden terugtrokken, heeft zowel vanuit Azië, Klein-Azië (ongeveer het huidige Turkije) als de Balkan en het Mediterrane gebied een gevarieerd spectrum aan soorten het huidige Hongarije bevolkt. De studie van dit proces heet biogeografie, een tak van de wetenschap die onder andere probeert de geografische afkomst en verspreiding van organismen te verklaren. In het Karpatenbekken heerst een complex klimaat met zowel boreale (van het hooggebergte of het noorden), continentale (van het continent, dus niet van de oceanen) als mediterrane invloeden. Deze lokale klimatologische diversiteit stimuleerde de import van een breed assortiment vlindersoorten met uiteenlopende afkomst. De huidige klimaatverandering verstrekt deze ontwikkeling aanzienlijk.

Het kenmerkende van Hongarije is dus dat er verschillende van dergelijke zoögeografische regio's samenkomen. Het land onderscheidt zich van andere landen door een relatief groot aantal continentale – uit Azië afkomstige -soorten. De combinatie van deze exotische soorten met soorten die ook te vinden zijn in West-Europa maakt Hongarije extra bijzonder.

Uit Azië zijn drie soorten luzernevlinders afkomstig: de steppeluzernevlinder (Colias chrysotheme), bremvlinder (*C. myrmidone*) en de oostelijke luzernevlinder (*C. erate*).

Ook de oostelijke vos (*Nymphalis xantomelas*), de tsarenmantel (*Arginnis laodice*), de oostelijke weerschijnvlinder (*Apatura metis*), de spireazwever (*Neptis rivularis*) en de Lathyruszwever (*N. sappho*) hebben hun oorsprong in het oosten. Deze laatste twee exotische soorten behoren tot het hoofdzakelijk tropische geslacht Neptis. Ze danken hun naam aan het vliegbeeld dat eerder doet denken aan zweven dan aan vliegen. De vlucht van de lathyruszwever is, zeker tijdens de balts, van een droomachtige schoonheid.

Van mediterrane oorsprong zijn bijvoorbeeld de “vreemde” snuitvlinder (*Libythea celtis*), het enige lid van deze familie in Europa, het blazenstruikblauwtje (*Iolana iolas*) en de kardinaalsmantel (*Pirgynnis pandora*), de grootste parelmoervlinder van Europa.

Uit de Balkan of Klein Azië zijn soorten afkomstig als het oostelijk esparcetteblauwtje (Polyommatus admetus), het oostelijk saffierblauwtje (*Plebeius pylaon*) en de dubbelstipparelmoervlinder (*Brenthis necate*).

Voorbeelden van bijzondere soorten die je ook in Noordwest-Europa aantreft zijn de zwarte apollovlinder (*Parnassius mnemosyne*), de roodbonte parelmoervlinder (*Euphydryas maturna*) en de grote ijsvogelvlinder (*Clemenitis populi*). Alleen de zwarte apollovlinder werd tijdens onze reis gezien, en dan zelfs maar één keer.
Hongarije telt zo’n 150 soorten dagvlinders. Tijdens ons verblijf in 2026 namen wij in totaal 82 soorten dagvlinders waar, waarvan 15 soorten parelmoervlinder en 13 soorten blauwtjes. In 2016 werden er 88 soorten waargenomen. Het grotere aantal dan dat van 2026 is vooral terug te voeren op het bezoek dat toen aan het Aggtelek National Park werd gebracht, wat vooral meer soorten blauwtjes tot gevolg had, zoals het oostelijk esparcetteblauwtje en het zuidelijk dwergblauwtje.

Fraaie aantallen natuurlijk als je het op soortniveau bekijkt. Rob de Jong vertelde ons echter dat de aantallen van deze soorten de laatste decennia substantieel waren gedaald, onder andere vanwege

het steeds warmer wordende klimaat en de daarmee gepaard gaande droogte. Natuuramnesie op detailniveau!


Van belang is ook wat je niet (meer) ziet. Tijdens ons verblijf (juni) zagen we bijvoorbeeld geen enkel groot geaderd witje. Ook uit observation.org waren geen waarnemingen te destilleren, ook niet in mei. Normaal gesproken wordt deze soort hier wel gezien. Desgevraagd meldde Rob de Jong ons dat dat juni te laat is om deze soort nog te zien. Het is qua aantallen een zeer variabele soort (mailbericht van 19 augustus 2026). In 2025 zag de auteur tijdens de KNNV-reis in de Cévennen erg veel groot geaderde witjes. Hij zag dat jaar in mei ook veel exemplaren in de Brenne (midden Frankrijk).
Kleine vossen werden in 2026 evenmin gezien, een ontwikkeling die al langer merkbaar is. Dagpauwogen zagen we in bescheiden mate. De kleine vos is in Nederland al langer op de terugweg, dagpauwogen worden de laatste jaren minder gezien dan gebruikelijk was.

In de nabijheid van het bezoekerscentrum van Hór-völgy waren we op een zanderig pad getuige van grote groepen drinkende vlinders. Tientallen klein geaderde witjes, keizersmantels, kardinaalsmantels, boomblauwtjes gemengd met kleine weerschijnvlinders, oostelijke grote vossen en snuitvlinders deden zich hier tegemoet aan het water uit verschillende modderplassen. Een indrukwekkend schouwspel.



Drinkende keizersmantels
Foto: Theo Briggeman

Langs dit bospad waren we ook getuige van de zweverige balts van twee spireazwevers, een fantastisch gezicht waar mannetje en vrouwtje in een langzame vlucht voor nageslacht zorgden. Ook de lathyruszwever werd langs dit pad waargenomen



Balts van twee spireazwevers
Foto: Theo Briggeman

In toenemende mate worden in het Bükk- gebied ook soorten gezien die als gevolg van een opwarmend klimaat zijn opgeschoven. De oostelijke vos en de kardinaalsmantel hebben sinds begin jaren 2000 hier een populatie gevestigd. We hebben ze beiden in flinke aantallen mogen aanschouwen.

Ook de distelvlinder was in grote aantallen in alle bezochte gebieden aanwezig. Net als in Nederland het geval was, lijkt er ook hier in 2026 sprake van een influx aan distelvlinders. Zoals bekend komen die plotselinge invallen met enige regelmaat voor.

Dat op observation.org ingevoerde waarnemingen, ook met behulp van ingestuurde foto's, nauwkeurig worden gevalideerd, bleek tenslotte uit een ingevoerde rups van de tweekleurige parelmoervlinder, die door de validator werd gewijzigd in een rups van de toortsparelmoervlinder. Enerzijds een bewijs dat er echt wordt gevalideerd, maar in dit geval ook naar een soort die in de Bükk op het randje van zijn verspreidingsgebied leeft en tijdens de KNNV – reizen niet eerder was gezien, en ook in 2026 niet verder werd waargenomen.



Snuitvlinder
Foto: Theo Briggeman



Zilvervlek
Foto: Willem Drok



Kleine weerschijnvlinder
Foto: Theo Briggeman



Vlinderonderzoek
Foto Theo Briggeman

Nachtvlinders en hun ecologie

Tekst: Janny Resoort
Waarnemingen en foto's: Theo Briggeman, Wankja Fergusson, Janny Resoort en Anna Maria van Paassen

Oost-Hongarije, en vooral het Bükkgebergte, biedt gunstige omstandigheden voor een grote verscheidenheid aan nachtvlinders. Koele loofbossen, vochtige dalen, warme kalkhellingen, struwelen en bloemrijke graslanden liggen er dicht bij elkaar.

In de natuur vervullen nachtvlinders een belangrijke ecologische functie. Veel soorten bezoeken bloemen en zorgen daarbij voor de bestuiving van planten. Vooral sterk geurende en lichtgekleurde bloemen, die 's avonds en 's nachts opengaan, zijn op nachtvlinders ingesteld.

Tegelijkertijd vormen zowel de rupsen als de volwassen vlinders een belangrijke voedselbron voor onder meer vogels, vleermuizen, spinnen en andere insecten.

De tijdens deze natuurreis verzamelde waarnemingen geven daarom niet alleen een beeld van de aangetroffen soorten, maar ook van de ecologische en landschappelijke verscheidenheid van Oost-Hongarije.

De meeste soorten uit de lijst zijn hoofdzakelijk actief in de schemering of nacht. Sommige daarvan, met name spanners en snuituilen, kunnen tijdens een wandeling wel overdag uit de vegetatie opvliegen. Dat is een reactie op verstoring en betekent niet dat ze als dagactieve nachtvlinders worden beschouwd.

Tot de overdag actieve nachtvlinders behoren opvallende soorten zoals bloeddrupjes, beervlinders en verschillende soorten wespvlinders. Ook de kolibrievlinder, een pijlstaart die stilstaand voor bloemen nectar drinkt, is vaak overdag te zien. Een andere opvallende dagactieve soort is de phegeavlinder (Amata phegea), een zwart-blauwe vlinder met witte vlekken en gele banden rond het achterlijf. Door zijn uiterlijk kan hij op het eerste gezicht voor een dagvlinder of zelfs een wesp worden aangezien. Ook verschillende beervlinders, uiltjes, spanners en pijlstaarten kunnen overdag actief zijn of tijdens een wandeling uit de vegetatie worden opgejaagd.

Onder de waargenomen nachtvlinders bevonden zich tien soorten die geheel of gedeeltelijk overdag actief zijn: *Penthophera morio*, phegeavlinder, plakker, boterbloempje, vals witje, prachtmot, kolibrievlinder, metaalvlinder, sint-jansvlinder en vijfvlek-sint-jansvlinder.

Bloeddrupjes zijn dagactieve nachtvlinders met donkere, metaalglanzende vleugels waarop opvallende rode vlekken liggen. Deze waarschuwingskleuren wijzen natuurlijke vijanden op de giftigheid van de vlinders.



Met deze LedEmmer kun je 's-nachts rondvliegende nachtvlinders met UV-licht lokken.

Dit is een methode die vooral geschikt is voor de eigen achtertuin en voor mensen die liever geen nacht opblijven, maar ’s morgens bij het ontbijt nachtvlinders willen bekijken.

Een lichtval is een grote bak gevuld met eierdozen waarop een soort grote trechter bevestigd is met daarboven een felle lamp.

Nachtvlinders komen op de lamp af en fladderen er omheen totdat ze per ongeluk door de trechter vallen en in de bak terecht komen. Daar gaan ze tussen de eierdozen zitten. Wanneer het ’s morgens licht wordt blijven ze daar rustig zitten en zijn ze goed te bekijken.

Tijdens onze natuurvakantie is de LedEmmer in de nachten van 8, 9 en 15 juni gebruikt en de ochtend na dit gebruik gecontroleerd op nachtvlinders. De controles na 8 en 15 juni zijn uitgevoerd door Janny Resoort, die na de nacht van 9 juni door Willem Drok en Theo Briggeman. De aangetroffen soorten zijn in de soortenlijst (zie bijlagen) verwerkt.

https://www.youtube.com/watch?v=CjjORuYDhRc filmpje hoe gebruik je deze LedEmmer



Phegeavlinder



Grote reuzenzakdrager



Synaphe moldavica



Sint Jansvlinder



Boterbloempje



Gele agaatspanner

Bijen en bloemen

tekst: Wankja Ferguson

Voorafgaande aan onze natuurreis was het de ambitie van Wankja Ferguson om zoveel mogelijk bijensoorten van het bezochte gebied te inventariseren door de soorten te fotograferen in relatie met de door de bijen bezochte bloemen. Dat bleek een enorme klus te zijn.
Het is van groot belang bijtjes in samenhang met de planten waarop ze voorkomen te fotograferen. Hoe meer bekend is over de samenhang tussen bij en bloem, hoe beter de bijtjes beschermd kunnen worden door de juiste planten te beschermen c.q. te behouden**.** Door planten te beschermen en kennis op te bouwen over de specialistische samenhang tussen bijen en planten wordt bekend wart er voor nodig is om ze effectief te beschermen. Het maakt wel dat je soms een keuze moet maken tussen fotograferen of vangen.



Fluitenkruidbij
Foto: Wankja Ferguson

Afgesproken was verder om aan het eind van een waarnemingsdag de waargenomen soorten op observation.org in te voeren. Daarvoor het je GPS gegevens nodig. Niet alle camera's hebben echter GPS tracking standaard in de camera. Met een mobiele telefoon kan je bijen meestal niet goed fotograferen. Dat veroorzaakte een niet voorzien probleem. Inmiddels is er door de onderzoekster een gps tracker voor bij de gebruikte camera aangeschaft. Het vraagt wel veel meer van je batterijen in de camera. Hoe dan ook: het is handig om er op voorbereid te zijn.

Tijdens onze reis naar Farm Lator e.o. zijn er onderweg in Hongarije al een paar stops gemaakt maar daar nog geen bijtjes verzameld. Dat blijkt achteraf gezien wel van belang. Het is in tegenstelling tot vlinders en andere insecten namelijk erg moeilijk gebleken de bijtjes met ofwel observation.org dan wel Obsidentify te determineren. Determineren met behulp van de foto's zelf blijft erg lastig. Doorgaans werden er meerdere foto's van de dieren in verschillende standen gemaakt omdat de nodige kenmerken vaak op verschillende delen van het bijtje zitten. Een voorbeeld: met regelmaat is het nodig een foto van de open vleugels van een bij te maken, wat het startpunt is om het genus van een bij te kunnen bepalen. Jammer genoeg is het zelden mogelijk een open vleugel te fotograferen en werkt deze methode niet of onvoldoende.

Tijdens de eerste dagen van onze reis waren er een aantal mensen die de opmerking maakten dat ze het niet prettig vonden dat er bijtjes voor het onderzoek werden gevangen. Dat heeft tot gevolg gehad dat er voor deel vanaf is gezien de bijtjes te vangen en zijn ze ook 's avonds niet direct opgezet. Dat is achteraf gezien niet verstandig geweest. Het determineren zou door het vangen en vooral direct opzetten vele malen makkelijker zijn geweest. Een volgende keer zou het goed zijn ze toch te vangen en op te zetten. Je kunt bijtjes nu eenmaal vaak niet middels foto's determineren, tenzij je ze op locatie zou weten te vangen en dan alle details op de foto zou weten te krijgen, wat bijvoorbeeld als er stuifmeel aan de poten zit vrijwel onmogelijk is.

In Hongarije komen 700 soorten bijen voor, dat is pakweg twee maal zo veel als in Nederland. Tijdens ons verblijf hebben we ruim 80 soorten waargenomen. Er zouden er nog veel meer te vinden moeten zijn. Het blijft een uitdaging om daar in het door ons bezochte gebied vaker naar te kijken en er dan meer te kunnen determineren. Het zou nog mooier zijn dat ook op andere plekken te doen.

Vóór de reis hebben we naar een website of iets dergelijks gezocht waar de Hongaarse soorten op te vinden zouden kunnen zijn. Eigenlijk vonden we toen eigenlijk alleen informatie over honingbijen, waar de Hongaren blijkbaar heel fier op zijn.

Ná de reis is nogmaals gezocht naar beschikbare bronnen en kwamen we nu een lijst met de hommel -soorten tegen en een lijst met de 700 soorten. Daarop staan alleen de namen van de bijensoorten plus de vermelding dat men er mee bezig is om meer informatie te verzamelen omdat men wel beseft dat ook in Hongarije er een probleem met het uitsterven of veranderen van de soorten gaande is. Hopelijk is er een volgende keer dus ook meer naslag- informatie voor handen. Het is bepaald geen gemakkelijk werk maar wel een erg leuk onderwerp, die wilde bijen!

In de bijlagen is een soortenoverzicht van de aangetroffen soorten opgenomen, waarbij we in een aantal gevallen niet verder kwamen dan een of meerdere “spec”- vermeldingen, omdat het foto materiaal geen afdoende zekerheid gaf over de waargenomen soort zelf.

Omdat we ondanks alle problemen toch al veel interessante kennis hebben verzameld over in ons onderzoeksgebied voorkomende bijensoorten werken we inmiddels aan een apart rapport over de resultaten van ons onderoek. Dit rapport wordt op een later tijdstip gepubliceerd op de landelijke Kennisbank van de KNNV. In de digitale versie van het reisverslag zal t.z.t. een link naar dit rapport worden opgenomen.



Gewone klokjeszandbij
Foto: Wankja Ferguson

Insecten

Tekst: Theo Briggeman (bron: Wikipedia).

Insecten, vliegend hert

Tijdens ons verblijf sprong er één insect wel heel erg in het oog: het vliegend hert. Het vliegend hert is een van de grootste kevers van Europa en kan een lengte van meer dan 9 cm bereiken. De naam houdt verband met de enorme kaken van de mannetjes. Deze zijn aan het einde vertakt en doen denken aan het gewei van een hert. Bij de vrouwtjes ontbreekt dit gewei. De kaken dienen alleen maar om te imponeren. Vrouwtjes hebben kleinere kaken waar ze gaten in de schors van bomen mee maken. Zij likken de sappen die uit deze gaten stromen op. Het vliegend hert is een bewoner van bosrijke gebieden. Hun larven eten vermolmd vochtig hout. Ze hebben een ontwikkelingscyclus van 4-8 jaar en zijn daarmee kwetsbaar.

De soort wordt tegen de schemering actief. Het mannetje zoekt dan een vrouwtje om te paren. Overdag worden er veel minder dieren waargenomen, maar over het algemeen hebben we er tientallen gezien.

In de tuin van het Team Huisje konden we ze vrijwel elke dag bewonderen. In Nederland is het vliegend hert een veel minder waargenomen soort. De soort komt hier nog op vier plaatsen voor. Een voorrecht om er zoveel te kunnen zien.



Foto's:Theo Briggeman



Klein vliegend hert (v).

Vliegend hert.

Poppenroof

Tekst: Anna Maria van Paassen

Op 18 juni tegen 18.00 uur zagen we mieren die hun poppen verplaatsten. Ze liepen in kolonne over het grasveld onder de waslijnen naar de border bij de B&B. Ik dacht dat ze hun poppen in verband met de warmte verplaatsten, maar toen ik later Rob de Jong vertelde wat we gezien hadden, werd hij helemaal enthousiast.


Het waren amazonemieren die de poppen roofden uit een nest formicamieren. Amazonemieren hebben grote kaken en zijn daardoor niet in staat om hun broed zelf groot te brengen. Hiervoor roven ze poppen bij de formicamieren en brengen de poppen naar hun eigen nest, waar ze als slaven de amazonemieren verzorgen. Toen we later gingen kijken waar de mieren naar toe gegaan waren was er niets van het nest te bespeuren.

Reptielen en amfibieën

Tekst Theo Briggeman

Soorten amfibieën en slangen

Soortnaam	**Wetenschappelijke naam**	**Waar?**
Gladde slang	Coronella austriaca	Tuin Farm Lator
Esculaapslang	Zamenis longissimus	Tuin Farm Lator
Ringslang	Natrix natrix	Tuin Farm Lator
Ringslang (dood)	Natrix natrix	Kleine Hortobágy
Oostelijke smaragdhagedis	Lacerta viridis	Asfaltweggetje naar Lator Puszta
Zandhagedis	Lacerta agilis	Diverse plaatsen, o.a. achter Répashuta
Europese moerasschildpad	Emys orbicularis	Visvijvers Grote Hortobágy



Gedroogde ringslang op reisgids
Foto: Theo Briggeman

Van de slangen zagen we de ringslang (drie keer), de gladde slang en de esculaapslang, die vooral rond de boerderij van Farm Lator kon worden gezien. Bij de visvijvers zagen we nog verschillende Europese moerasschildpadden.

Van de amfibieën zagen we de springende kikker, de bruine kikker en de pad.

Hagedissen

Er werden tijdens ons verblijf vier soorten hagedissen waargenomen: de westerse smaragdhagedis, de levendbarende hagedis, muurhagedis en de zandhagedis.



Zandhagedis
Foto: Erik Ketting



Oostelijke Smaragdhagedis Foto: Frans Duijm



Muurhagedis. Foto: Theo Briggeman



Levendbarende hagedis Foto Frans Duijm

Zoogdieren


Tekst: Theo Briggeman en Erik Ketting

Soorten zoogdieren

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Waar?
Vleermuizen zie hieronder		
Das (sporen)	Meles meles	Omgeving Lator Puszta
Europese Bever (sporen)	Castor fiber	Visvijvers Hortobágy en ooibossen Tiszadada
Wild zwijn	Sus scrota	Plateau boven Lator Puszta
Ree	Capreolus capreolus	Agrarisch gebied
Vos (jong exemplaar)	Vulpes vulpes	Bos noordelijke Hór-vallei
Hermelijn	Mustela erminea	Kleine Hortobágy

Vleermuizenonderzoek

Tekst: Erik Ketting en Theo Briggeman



Bij Farm Lator hebben we in de avond van 14 juni 2026 met behulp van een detectiesysteem vleermuizen geïnventariseerd. We gebruikten de Echo Meter Touch 2 Bat Detector. Dat is een microfoon die je op je telefoon aansluit met bijbehorende app op je telefoon. De app herkent de ultrasone geluiden en geeft aan welke soort het is. Er wordt ook een frequentiespectrum van gemaakt. Zie als voorbeeld het spectrogram van de laatvlieger hieronder.

De meldingen zijn geregistreerd bij Observation.org zodat ze ook voor de wetenschap beschikbaar komen.

De volgende soorten zijn waargenomen:

- Schreibers vleermuis
- laatvlieger
- rosse vleemuis
- gewone dwergvleermuis
- kleine dwergvleermuis

Een opvallende soort is de Schreibers vleermuis (ook wel langvleugelvleermuis -*Miniopterus schreibersii*- genoemd) die in grote aantallen in de karstgrotten van het Bükk-gebergte leeft. Het gebied telt meer dan duizend grotten en vormt daarmee een belangrijk gebied leefgebied van deze soort. De vrouwtjes zijn voor de voortplanting en het vormen van kraamkolonies sterk afhankelijk van de warme ondergrondse grotten in dit kalksteenlandschap. De soort is vernoemd naar K.F.A.

von Schreibers, directeur van het Weens Museum. De soort staat sinds 2023 op de rode lijst van het IUCN.

Insecten

Soortsnaam	Wetenschappelijke naam	Waar?
		Dijk langs ooibossen
Rosevleugel (sprinkhaan)	Calliptamus italicus	Tiszadada
Vliegend hert	Lucanus cervus	Omgeving Farm Lator
		Diverse plaatsen Bukk-
Gouden tor	Cetonia aurata	gebergte
Rouwende gouden tor	Oxythyrea funesta	Visvijvers Grote Hortobágy
Plagionotus floralis ('n boktor)	Plagionotus floralis	??
		o.a. plateau boven Lator
Blauwzwarte houtbij	Xylocopa violacea	Puszta
Kleine roodoogjuffer	Erythromma viridulum	Visvijvers Grote Hortobágy
Lantaarntje	Ischnura elegans	Visvijvers Grote Hortobágy
Blauwe breedscheenjuffer	Platycnemis pennipes	Visvijvers Grote Hortobágy
Gewone oeverlibel	Orthetrum cancellatum	Visvijvers Grote Hortobágy
Ladderboktor	Saperda scalaris	Omgeving Kisgyor
Gele wespenboktor	Plagionotus detritus	Bükk NP
Alpenboktor	Rosalia alpina	Bükk NP
	Chrysolina	
Roodgezoomde goudhaan	sanguinolenta	Beekdal bij Kisgyor

Overige soorten

Soortsnaam	Wetenschappelijke naam	Waar?
Wijngaardslak	Helix pomatia	Diverse plekken
		Oever Tisza reservoir bij
Chinese vijvermossel	Sinanodonta woodiana	Porosló
Leem-kieuwpootkreeft	Triops cancriformis	Poeltje (bandenspoor) Csincsé-vallei bij Kisgyor
Gewone doolhofspin	Agelena labyrinthica	Csinsé-vallei bij Kisgyor

Schimmels/zwammen

Gesteelde lakzwam	Ganoderma lucidum	Omgeving Tisza
Ruig elfenbankje	Trametes hirsuta	Plateau boven Repashuta
	Candolleomyces	
Bleke franjehoed	candolleanus	Plateau boven Repashuta
Roestbruine kogelzwam	Hypoxylon fragiforme	Plateau boven Repashuta
Pragmidium spec.	Pragmidium spec.	Omgeving Kisgyor



Gesteelde Lakzwam
Foto: Erik Ketting

Literatuur

Algemeen

- Website Bükk Nationaal Park, via vertaal-app.
- Crossbill Guide Hort Hilbers, Dirk, (2007),The Nature Guide to the Hortobágy and Tisza river foodplan. Crossbill Guides Foundation. KNNV Publishing.

Planten

- Jávorka Sándor en Csapody Vera(1975). Iconographia florae partis ausstro-orientalis Europae centralis.
- Henning Haeupler, Thomas Muer (2000, 2007). Bildatlas der Farn- und Blutenpflanzen Deutschlands.
- Oliver Tackenberg (2023). Die Flora von Deutschland.
- PADAPT Pannonian Database of Plant Traits https://padapt.eu/en
- Vascular plants of Hungary online database https://floraatlasz.uni-sopron.hu/
- Obsidentify
- PlantNet
- Waarnemers: Janny Resoort, Willem Drok, Jan van der Veer, Theo Briggeman, Erik Ketting

Vogels

- Bakker, Volkert. (2021), Kampeervakantie Tiszagyenda, Hongarije, 11 t/m 24 september 2021.
- Gosney, Dave (2015), Finding Birds in Hungary. Easybirder Sheffield.
- Hilbers, Dirk, (2007),The Nature Guide tot the Hortobágy and Tisza river foodplan. Crossbill Guides Foundation.
- KNNV Publishing.
- Hottinga, Adrie (eindredactie) (2010). Hongarije-vogelreis 2010. VWG KNNV afd. Epe-Heerde.
- Kerkhof, E. (eindredactie) (2026), Hongarije, vlinders en planten. 25 juni-5 juli 2016. KNNV-reis 2016.
- Keller, V. et al (2020). European Breeding Bird Atlas 2. EBCC & Lynx Editions.
- KNNV (2008). Noord-Oost Hongarije, KNNV-reis 21-31 mei 2008.
- Maas, Dirk & André Beijersbergen (2013). KNNV-reis Hongarije – Roemenië 31 mei – 17 juni. KNNV 2021.
- Ouweneel, Gerard (2022), Hongarije koestert zijn Keizerarenden Aquila heliaca. De Takkeling 30(3), 217-222.
- Szép T., Csörgö T., Halmos G., Lovászi P., Nagy K. & Scgnudt A, (red.) 2022. Birds of Hungary. Ook digitaal.
- Reisverslagen KNNNV AKC (zie ook literatuur planten)
- Zijlstra, Otte. (2008). Vogels kijken op de Hongaarse poesta. Het Vogeljaar, 56(1), 18–20.

Dagvlinders

- Argeloo, Marc (2022), Natuuramnesie. Atlas Contact.
- Briggeman, Theo & Corrie Lesuis (2016). Fotografisch verslag natuurreis Tsjechië en Hongarije
- Rob de Jong: Groeten uit Hongarije. Vlinders 1/2000
- Rob de Jong: Hongarije: ontmoeting tussen oost en west. Vlinders 1/2007
- F. Bos et al: Zuidelijke luzernevlinder Colias alfacarienis. En Steppeluzernevlinder. Colias chrysotheme. De dagvlinders van Nederland. 2006.

- Ekhart, Fokko & Sven Bontenbal (2021). Het Bükk-gebergte. Eldorado voor vlinderliefhebbers.
  Vlinders 2/2021
- Lafranchis, Tristan. Dagvlinders van Europa. KNNV Uitgeverij. 2009
- Tolman, Tom & Richard Lewington, Dagvlinders. Veldgids voor Europa en Noordwest-Afrika. Kosmos. 2021
- Verslag KNNV-reizen 2008, 2010, 2016, 2021
- Werkman, Elvira & Maxime Beek (2023). Een vlucht distelvlinders. Uitgeverij Noordboek Natuur.
- Digitale informatie over vlinders in Hongarije: Magyarország lepkéi.

Bijen

- Falk,Steven (2017). Bijen van Nederland en Vlaanderen (oorspronkelijk Engels). Kosmos Uitgeverij.
- Ook de website van Steven Falk https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/albums/
- Kos, Martjin et all. (2022). Veldgids hommels van Nederland en België. KNNV Uitgeverij.
- Michez, Dennis et all. (2019). Bees of Europe. Vermande.
- Paul, Alain (2021). Abeilles de Belgique, Famille Halictidae
- Rasmont Pierre et all. (1992). Bumble bees of Europe
- Scheuchl Erwin et all. (2016). Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas
- Westrich Paul (2018). Die Wildbienen Deutchlands.

- Achtergrondstudies:

- https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-bijen
- https://www.bestuivers.nl/rodelijst
- www.wildebijen.nl.

- De website van Tim Faasen: https://www.wildphoto.nl/gallery/thumbnails.php?album=38.



Wat zit daar toch? Foto: Theo Briggeman

Verslagen van de excursies

Wandelingen dichtbij Farm Lator

8 juni — Latorpuzsta: kalkgraslanden en bossen

Zie ook gebiedskaartje Latorpuszta rondje vanaf de camping

Verslag	Corrie
Datum	8 juni 2026
Aantal deelnemers	allen
Weersomstandigheden	¾ zonnig, ¼ bewolkt
Vervoer	wandelend van af de camping
Duur van de excursie	4 uur, 9-15 uur
Afstanden	Route: ca. 1,5 km de weg af, dan linksaf door het bos naar boven, zwerven over het plateau en dicht bij de camping weer naar de weg toe
Moeilijkheidsgraad	1
Rapportcijfer	7
Waardering	7, mooie wandeling door rijke natuur

Deze eerste dag wandelden we vanuit Farm Lator. Langs de weg was van alles te zien en te horen, uiteraard was alles nieuw voor ons. In een boom riepen Draaihalzen naar elkaar, een Kleine Weerschijnvlinder ging op de hoed van onze excursieregelaar zitten, op een Pijpbloem vonden we de rups van de Zuidelijke Pijpbloemvlinder. Ook de Smaragdhagedis liet zich goed bewonderen.

Na 1,5 km sloegen we linksaf het bos in. Van nature groeit hier eikenbos, maar de robinia had het hier helemaal overgenomen. We bereikten de min of meer vlakke top van de heuvel. Hier ligt een uitgestrekt kalkgrasland dat echter al grotendeels dichtgegroeid is met sleedoorn. Toch was er nog een grote rijkdom aan planten, vlinders en ander leven te vinden. Daaronder veel soorten die we ook van Nederlandse kalkgraslanden kennen, maar ook veel Midden- en Oost-Europese soorten zoals de Hongaarse thijm. Her en der een uitgebloeide orchidee; alleen de Bergnachtorchis stond nog te bloeien. Veel vogels waren er niet te zien. Op sommige plekken werd gemaaid om het dichtgroeien te voorkomen, en ook waren grote delen afgebrand. Plaatselijk woelden wilde zwijnen de boel om.

Aan het einde van het veld kostte het enige moeite om iedereen te verzamelen, want KNNV'ers zijn langzaam, maar sommige KNNV'ers zijn nóg langzamer.

De afdaling naar de weg liep door een laag bos dat een meer oorspronkelijk karakter had. De boomlaag bestond uit moseik, donzige eik, zomer- en wintereik en haagbeuk en als struiken

veld- en Tartaarse Esdoorn, kardinaalsmuts, hazelaar, wilde peer en liguster. In de ondergroei bloeide alleen nog het prachtklokje.

Op de weg lag vlak bij de camping een platgereden pad, waarop een grote weerschijnvlinder zich tegoed deed aan de lichaamssappen. Een luguber plaatje van de 'circle of life'.

19 juni Omgeving Farm Lator

Zie kaartje Rondje vanaf camping Farm Lator

Verslag	Willem
Weer	zonnig, deels bewolkt, ca 30 graden
Deelnemers	3
Route en wandeling	Te voet, ca. 12 km, duur 4,5 uur
Stijging/daling	100m, enkele lastige passages aan het begin (evt. te vermijden door de route aan te passen), verder gemakkelijk
Waardering:	mooie verkenning van de achter de kampplaats liggende bossen

Nu het einde van het kamp nadert, hadden wij behoefte aan een doorstapwandeling zonder autogebruik. We vertrokken om 9 uur en sloegen het paadje in naast het infobord links van de brug bij de camping. Dit pad hadden we eerder met de nachtzwaluwen-excursie genomen.

Het pad gaat steil omhoog, deels met trappetjes. Na een tijdje maakt het bos plaats voor met sleedoorn dichtgegroeid grasland. Na een flinke klim zijn we boven, en hebben een mooi uitzicht richting de vlakte in het oosten. Het pad leidt naar de resten van een prehistorische ringwalburcht. En, zoals archeologen weten, die ligt op een uitstekende rots in het landschap. We moesten dus weer naar beneden. Onderweg liet een Koninginnepage op slangenkruid zich uitgebreid bewonderen en fotograferen. Na een lastige afdaling over losse grond kwamen we op een pad in een smal dal. Dit liep door het bos langzaam omhoog naar een open, rotsachtig terrein met verspreid dennen. Hier meende Willem een Grijze Gors te zien, maar dat kon niet voldoende bevestigd worden. De route leidde verder langs gevarieerd bos – dan weer eikenhakhout, dan weer opgaand eikenbos of haagbeukenbos – en kruiste een asfaltweg, die lag te branden in de zon. Via een weinig gebruikt bospad konden we deze ontwijken, maar uiteindelijk kwamen we er toch op uit. Deze weg leidde naar een bekend kruispunt: waar we eerder tevergeefs het Rode Bosvogeltje gezocht hadden. Landschappelijk is het hier bijzonder fraai, met mooie bloemrijke graslandjes. Her en der staan lindebomen die zoemden van de bijen. We zagen de Alpenbok en het Kaasjeskruiddikkopje. Op de kruising sloegen we linksaf naar Lator puzsta. Op het eerste gezicht is dit een saaie lange weg door eenvormig bos. Maar wandelend beleef je het anders, je ziet meer. Bovendien was het een beschaduwde, rustig dalende weg waar een verfrissend windje woei. We genoten van de rijke bosvegetatie met Helleborus, Mansoor en Roodblauw Parelzaad. We vonden Wolfskers en een prachtig bloeiend Rood Bosvogeltje. Onder de vele verkeersslachtoffers op de weg waren vliegend hert, gouden tor, heivlinder en ringslang. Vlak bij de camping zagen we nog iets bijzonders: op een steile wand in de schaduw zaten vele vlinders (vooral Keizersmantels) aan het zandige gesteente te likken. Dat gedrag hadden we wel bij modderplassen gezien, maar niet direct aan gesteente.
Rond 13.30 waren we weer op de camping.

Cserepfalu

9 juni Schrale graslanden NO Cserepfalu

Excursie naar de schrale graslanden ten noordoosten van Cserepfalu, zie gebiedskaartje Cserepfalu grasland

Verslag	Anne
Aantal deelnemers	5
Weersomstandigheden	zon 30* graden
Afstanden	41 kilometer
Vervoer	Startpunt wandeling: parkeren bij het bezoekerscentrum Horvolgy (bij 47*57'41, 8"Noord 20*32"40, 1" Oost
Duur van de excursie	6 uur
Afstanden	5 kilometer
Moeilijkheidsgraad	2
Wandeling	rechtsaf van de parkeerplaats (niet de vallei in)
Rapportcijfer	8
Bijzonderheden	bijeneters in de lucht, zomereik, mooie oude eiken, vlinders



Zomereik
Foto Erik Ketting

9 juni Valleiwandeling Cserepfalu

Excursie: Valleiwandeling Cserepfalu vanaf bezoekerscentrum
https://maps.app.goo.gl/F52vopigrm2Sgoj46?g_st=aw
zie ook: wandeling per gebied: Cserepfalu dal bij bezoekerscentrum 9 juni

Verslag	Janny
Deelnemers	4
Weersomstandigheden	Erg warm, zon, tegen de 30 graden
Vervoer naar startpunt	Auto
Afstand	vv 75 km, tot wandelgebied
Duur excursie, verkorte versie	4,5 uur
Moeilijkheidsgraad	3
Rapportcijfer voor gebied:	7, gem van alle deelnemers
Zeer interessante wandeling	Voor vlinderaars, veel vinders op rustplaats bij de 2e groeve gouden tor Prehistorische groeve bij punt 3 van de wandelroute
Startpunt wandeling	Bezoekerscentrum in Hór-völgyi Látogatóközpont Cserépfalu
Bijzonderheden:	Zie gevonden planten bij de gebiedsbeschrijving van deze wandeling

We maakten een wandeling vanuit het bezoekerscentrum Hór-völgyi Látogatóközpont in Cserépfalu, gelegen aan de zuidrand van het Bükk-gebergte in het Natura 2000-gebied Hór-völgy és Déli-Bükk (HUBN20002). De volledige route is 16,5 km lang, maar in een KNNV-tempo legden we 6 à 7 km af.

Vanuit het bezoekerscentrum is een educatieve wandelroute uitgezet met twaalf informatiepunten. Veel bezoekers volgen deze route naar de Suba-lyuk-grot, een belangrijke prehistorische vindplaats in de steile wand van de Hór-vallei. De Suba-lyuk-grot, gevormd in Trias-kalksteen, is zowel geologisch als archeologisch van groot belang. Hier zijn resten gevonden van Neanderthalers, stenen werktuigen en fossiele resten van onder andere grotbeer, leeuw en hyena. In de vallei zijn bovendien nog sporen aanwezig van vroegere steengroeven, kalkovens en oude handelsroutes.

De Hór-völgy is een lang, kalkrijk dal langs een drooggevallen beek en behoort tot de langste kalksteendalen van Hongarije. Door de afwisseling van kalksteenhellingen, dalbodems, rotsen en verschillende microklimaten ontstaat op korte afstand een grote variatie aan leefgebieden.

Landschappelijk vormt het gebied een bijzondere overgang tussen de warmere, drogere Bükkalja en de koelere, bosrijke Bükk. Droge kalkhellingen, rotsvegetaties, hellingbossen, beukenbossen, eiken-haagbeukenbossen en open steppeachtige graslanden liggen hier dicht bij elkaar. Hierdoor komen tal van karakteristieke Pannonische planten- en diersoorten voor die kenmerkend zijn voor het Karpatenbekken.

Deze wandeling kun je echt wel bestempelen als een vlinderwandeling daar we bij punt 3 – een rotswand – in een wolk van allerlei soorten parelmoervlinders terecht kwamen waarbij we al eerder de Koningspage en de Witbandzandoog hadden gespot.

De vogelstand was wat achtergebleven met weinig onbekende soorten.

Daarentegen kwamen we vooral in de bosranden nog leuke plantensoorten tegen als: Ruig klokje, Hertswortel, Hoge raket, Stinkende ballote, Purperorchis, Doorwaskervel, Pimpernoot,

17 juni Tard en vallei bij Cserépfalu

O.l.v. Rob de Jong
Excursiegebied Tard en dal bij bezoekerscentrum Cserépfalu,
zie gebiedskaartje: Tard en dal bij bezoekerscentrum

Aantal deelnemers	allen
Weersomstandigheden	25 graden
Vervoer	4 auto's
Duur van de excursie	Verschillend, afhankelijk of er nog een deelname was aan het vervolg
Afstanden	Rit 36 kilometer Wandeling 2 kilometer
Stijging/dal	licht hellend
Moeilijkheidsgraad	1
Rapportcijfer	matig: de grasvlakte bij Tard was erg droog 8 voor de vlindervallei
Speciaal interessant voor	Bij Tard Vogels: veel bijeneters, steenuil, bonte specht Planten: vedergras, clematis integrifolia Voor planten viel het tegen, erg droog Daarna door naar de vlinderrijke vallei: o.a. In de groeve een sedumblauwtje, zandhagedis In Tard staan 3 puszta huizen
Startpunt wandeling	1. Bij Tard 2. bezoekerscentrum Horvogy



Vedergras
Foto Erik Ketting





Clematis Integrifolia

Foto's: Theo Briggeman

18 juni Cserépfalu met vlindervallei

Excursiegebied: Nogmaals het bezoekerscentrum Cserépfalu met vlindervallei

Verslag	Dolf Logemann
Deelnemers	3

Het viel tegen: de modderplasjes voor de vlinders waren opgedroogd. Wel een mooie veer van een oehoe gevonden.



Veer van een oehoe.
Foto: Dolf Logemann

Búkkzserc

10 juni Kalkgraslanden achter Búkkzserc

Excursiegebied	Kalkgraslanden achter Búkkzserc,

zie kaartje: gebied Búkkzserc, 10 juni
https://goo.gl/maps/ZwqKyMa8atTDjbUM6?g_st=aw

Verslag	Willem
Weer	Zonnig, warm
Deelnemers	4
Route	Auto 44 km enkele reis
Wandeling	Ruim 2 km, deels ongebaand, enkele lastige hellingen
Waardering	Enkele van de mooiste kalkgraslanden die we gezien hebben

Direct naast de auto begonnen de insecten- en bloemrijke hellingen al, met al eerste opvallende soort: het brandkruid (*Phlomis tuberosa)*, een roze bloeiende verwant van de bekende geelbloeiende tuinplant. Het pad voerde tussen twee akkers door, afgezet met schrikdraad tegen de wilde zwijnen. Langs de akkers leuke planten als de Zomeradonis en Echte en Valse ridderspoor. We kwamen op een graslandje, weer een feest van bloemen en vlinders. Wilde reseda met resedawitje, veel parelmoervlinders (o.a. de paarse parelmoervlinder), en de dagactieve nachtvlinder *Zygaena carniolica*, een St. Jansvlinder met geel omrande vlekken. Een gewasje met een pluim van kleine bloempjes, als gipskruid, bleek een schermbloemige: *Trinia glauca*. Het graslandje ernaast was weer heel anders, met zwarte brem en geel Vlas, maar ook

heel rijk. Ondertussen hoorden we voortdurend de kwartels kwikken en de zomertortels koeren; de grauwe klauwier liet zich zien en de hop en de bijeneter lieten zich horen.

Nadat we daar onze boterhammen hadden genuttigd, moesten we door een dalletje naar de volgende helling; dit perceel was helemaal verruigd met Canadese fijnstraal. De niet-klimmende bosrank *Clematis integrifolia* en de glanzende ruit *Thalictrum lucidum* herinnerden aan betere tijden. De helling waarop we daarna kwamen was wel de mooiste, landschappelijk, maar ook qua flora en fauna: wildemanskruid, grote anemoon, venusschoentje waren uitgebloeid; reuzenvleugeltjesbloem, trosmargriet en *Cirsium pannonicum* (een op Spaanse ruiter lijkende distel) bloeiden volop; de grote muggenorchis begon net. Ook stonden er enkele vuurwerkplanten. De hitte begon ons parten te spelen, maar we gingen nog door; via een veld met o.a. gevlekt biggenkruid en veel voorjaarsadonis, waar ook het bloemenblauwtje vloog, kwamen we op het laatste weitje, dat al aardig dichtgroeide met sleedoorn en daardoor zwaar om te doorkruisen. Ook de afdaling naar de weg was niet gemakkelijk. Eenmaal op de weg was het nog enkele honderden meters naar de auto.

14 juni — Kalkgraslanden achter Búkkszerc

Excursiegebied zie ook gebied Búkkzserc 14 juni	Kalkgraslanden achter Búkkszerc,
Verslag	Corrie
Aantal deelnemers	3
Weersomstandigheden	Zon/licht bewolkt
Vervoer	1 auto
Duur van de excursie	6 uur

Een mooie wandeling over mooie weiden, voor een deel gemaaid, maar later op een steilere helling nog genoeg bloemen (zie eerder verslag van 10 juni), ook orchissen gezien.

Hierna in de middag nogmaals naar Bezoekerscentrum voor een korte wandeling in de vallei voor de vlinders, dat viel tegen, niet zoveel vlinders als de anderen hadden gezien.

Kleine Hortobagy

11 juni — Rondrit Kleine Hortobagy

met Rob als excursieleider

Excursiegebied	Rondrit Kleine Hortobagy, zie pagina gebied kleine Hortobagy https://goo.gl/maps/wHiy9zdXjVcef2MU7?g_st=aw
Verslag	Corrie
Datum	11 juni 2026

Aantal deelnemers	allen
Weersomstandigheden	¾ zonnig, ¼ bewolkt
Vervoer	4 auto
Duur van de excursie	8 uur
Afstanden	46 kilometer
Moeilijkheidsgraad	1
Wandeling	2 x 1 km
Rapportcijfer	9
Speciaal interessant voor	Vogels: sakervalk, bijeneters, keizerarend, klapekster, grauwe klauwier



Foto: Marjanne van Esveld

20 juni

Rondrit Kleine Hortobagy

Excursiegebied	Rondrit Kleine Hortobagy
Verslag	Jan
Aantal deelnemers	2
Weersomstandigheden	Regen, bewolkt, onweer
Vervoer	Auto
Duur van de excursie	3,5 uur
Afstanden	Rondrit, 2 x 35 kilometer, vlak
Moeilijkheidsgraad	1
Rapportcijfer	7,5
Speciaal interessant voor	Vogels Boomvalk, bruine kiekendief, torenvalk, bonte kraai, roodpootvalk, roodborsttapuit, grauwe klauwier, huismus en ekster
Rondrit	Búkkabrany – Mesokeresztes - Mezocsat – pontje Arokto – Tiszacsege – Egyek – pontje ging niet (dus terug) – Tiszafured – Poroszlo – Negyes – Szentisvan – Búkkabrany (Wilden een rondje maken met 2 pontjes, maar helaas lukte niet)

Repashuta

12 juni Repashuta

Excursiegebied Hoogvlakte van Repashuta, zie gebiedskaart Gebied: Repashuta
https://goo.gl/maps/wHiy9zdXjVcef2MU7?g_st=aw

Verslag	Jan
Aantal deelnemers	allen
Weersomstandigheden	half bewolkt
Vervoer	4 auto's
Duur van de excursie	8 uur
Afstanden	59 kilometer, door het nationaal park
Moeilijkheidsgraad	2
Wandeling	3 km
Rapportcijfer	9
Speciaal interessant voor	planten en vlinders, Siberische lis, roggelelie onderweg: rode bosvogel (orchidee)

NB. Voor de bospaden in het nationaal park is een vergunning nodig. Rob de Jong schrijft deze voor je uit.



Roggelelie
foto: Erik Ketting

Grote Hortobagy

10 juni Wandeling langs de Tisza

Excursie gebied wandeling langs de Tisza- oever met daarna een oversteek met het pontje

Verslag	Corrie
Datum	10 juni 2026
Aantal deelnemers	7
Weersomstandigheden	Zonnig
Vervoer	2 auto
Duur van de excursie	8 uur
Afstanden	41 kilometer tot wandelgebied, in totaal 75 km
Moeilijkheidsgraad	1
Wandeling	7 km, startpunt bij de dam, daar ook ruimte om te parkeren
Rapportcijfer	6
Bijzonderheden	niet veel uitzicht op het water door bomen en een saaie dam De autorit was afwisselender.
Bijzonderheden	O.a. gewone buidelmees, oostelijk resedawitje Leuk pontje om mee over te steken (met geraniums)

13 juni Visvijvers Hortobagy Halasto

Excursiegebied	Visvijvers Hortobagy Halasto, zie ook gebiedskaartje Hortobagy visvijvers

https://maps.app.goo.gl/8jLtngs6VHqNv3gRA?g_st=aw

Verslag	Frans
Aantal deelnemers	12
Weersomstandigheden	Half bewolkt
Vervoer	Auto
Totale duur van de excursie	9 uur
Afstanden	Totaal 185
Moeilijkheidsgraad	n.v.t.
Rapportcijfer	10
Speciaal interessant voor	Vogels,
Startpunt van de wandeling	Visvijvers ten oosten van het dorpje Hortobagy. eerst over de centrale dam gelopen tot plas- en drasgebied

Vervolgens linksaf over het spoor en langs de vijver met grote vissen tot aan de grote plas in het zuidwesten van het gebied. Deels bedekt met bloeiende water hyacint. Daar ook nog een aantal Daarna doorgelopen over de centrale dam naar 2 “uitkijktorens” bij “stations”. Nog ook diverse soorten vogels bekeken, ook nieuwe soorten daar o.a. de buidelmees. En voor de vlinders het oostelijke resedawitje.
Om 3 uur begonnen terug te lopen, om half 7 op de camping.

15 juni — Tiszadob, Tiszadam


Excursiegebied	Tiszadob, Tiszadam, zie gebiedskaartje Tiszadob

Https://goo.gl/maps/qvoXJUH5bjgfV5qu5?g_st=aw

Verslag	Marijke
Aantal deelnemers	9
Weersomstandigheden	25 graden,
Vervoer	2 auto's
Duur van de excursie	8 uur
Afstanden	90 kilometer
	Wandeling 5 kilometer, zeker een 3 km extra omdat we terug moesten en omlopen vanwege een kasteelheer (kasteel Andrassy) die het ons verbod. Cross Bill Guide route 9 klopt dus niet meer. De dijk is ook geasfalteerd Onder aan de dijk nog wel leuke waarnemingen (zie waarnemingen per gebied)
Moeilijkheidsgraad	1, wel vermoeiend vanwege warmte, omlopen en asfalt
Rapportcijfer	3/4
Speciaal interessant voor	Roerdomp
Startpunt wandeling	Tiszadob.
	Niet aan te bevelen.
	Maar voor een volgende excursie raden dan eventueel start vanaf Tisdada, heen er terug daar bij een afdamming

19 juni — Grote Hortobagy – 1

Verslag	Marijke
Weer	Heet, droog
Deelnemers	Frans en Marijke
Duur van de excursie	11 uur
Vervoer	Auto, afstand 220 km
Lopen, wandelen	2 km, stijging/daling 0 m, moeilijkheidsgraad 1
Rapportcijfer	9
Speciaal interessant voor	Vogels




ROUTE 1:
Vogels kijken vanuit auto vanaf weg 33 afslag richting Nagyiván. Na 2 à 3 km links af onverharde weg op. Doorgereden tot bouwval van boerderij, Vandaar terug met een extra lus langs andere bouwval van boerderij. Scharrelaars, hoppen, torenvalk, grasmus, roodborsttapuit en ringmussen.

ROUTE 2: Aan weg 33 geparkeerd naast woning bij paal 79, Vandaar gelopen naar acaciabos met roekenkolonie en roodpootvalken. Tevens bijeneter en ransuil.

ROUTE 3:



Route 3 : Naast afslag van weg 33 richting Nadudvar een onverhard weggetje naar kanaal Keleti-Föcsatorna. Op de dijk diverse vogels gehoord in het riet, onder andere bosrietzanger. De Merlin-app gaf ook een zwartkoprietzanger aan en een oostelijke vale spotvogel. De zwartkoprietzanger is ook elders langs het kanaal gehoord zonder bosrietzanger in de buurt. Het signaleren van een vale spotvogel kan misschien berusten op imitaties door de bosrietzanger.



ROUTE 4: Vanaf weg 33 afslag naar Nadudvar. Door het dorp naar het westen tot over een brug over de de rivier Hortobagy. Bocht naar rechts gevolgd en daarna over betonweg naar links (= west) tot aan militair monument en terug, aan het eind van de middag vanuit de auto zoekend naar eventuele grote trappen. We hebben ze niet gezien. Wel grauwe kauwieren, kleine klapekster, gele kwikstaart, witte kwikstaart, veldleeuweriken en veel spreeuwen.

19 juni Grote Hortobagy - 2

Excursiegebied Grote Hortobagy - 2

Verslag	Corrie
Aantal deelnemers	6
Weersomstandigheden	zon 30*
Vervoer	2
Duur van de excursie	6
Afstanden	Rondrit, 35 kilometer
Moeilijkheidsgraad	1
Rapportcijfer	7,5
Speciaal interessant voor	Vogels: bijeneters (bij Kaparo Csarda, weg 33t.o. in het bosje), roodpootvalken, takkelingen Gezocht en niet gevonden: trappen

Eger

14 juni — Uitstapje naar Eger

Verslag	Marjanne
Aantal deelnemers	3
Weersomstandigheden	Licht bewolkt
Vervoer	Auto, 44 km enkele reis (43 min)

Eén van de weinig historische steden van Hongarije. Mooie burcht, een Turkse minaret, mooie kathedraal, mooi centraal plein. Eger is ook beroemd om de wijn. We dronken een glas van de beroemdste eger-wijn, stierenbloed, waarvan het verhaal gaat dat de vrouwen hun mannen deze wijn gaven, waarop de overwinning op de Turken volgde.
Leuk uitstapje voor een middag.

Hor vallei

16 juni — Noordelijke Horvallei

Excursiegebied	Noordelijke Horvallei (karstbossen)
Verslag	Dolf Logemann
Datum	16 juni 2026
Aantal deelnemers	6
Weersomstandigheden	25 graden, schaduwrijk bos
Vervoer	2 auto’s
Duur van de excursie	
Afstanden	Rit 26 kilometer Wandeling 6 kilometer
Stijging/daling	ja, maar niet heel erg stijl
Moeilijkheidsgraad	2; met veldkeien verstevigd bospad; oneffen; bij nat weer g glad
Rapportcijfer	8
Speciaal interessant voor	Karstbossen, planten, vogels, vlinders
Startpunt wandeling	Op kruispunt van bospaden, op aanwijzing van Rob de Jong

NB. Voor de bospaden in het nationaal park is een vergunning nodig. Rob de Jong schrijft deze voor je uit.

Via een stelsel van bospaden reden we door het nationaal park naar het startpunt, bestemming noordelijke Horvallei. Dit is een schaduwrijk bospad door prachtige oude eikenbossen op kalkbodem, zg. karstbossen. Aldaar een grote variatie aan bosplanten en in de berm een rijke zoomvegetatie. De bermen zijn ook vlinderrijk. We liepen door tot een aantal hooilandjes links

en rechts van het pad. Links een mooie gevarieerde graslandvegetatie. Rechts erg rijk aan insecten, waaronder een zwarte apollo en veel libellen. Hierna keerden we terug naar het beginpunt.

KisgyÖr

16 juni Graslanden Kisgyör

Excursiegebied Graslanden Kisgyör, zie gebiedskaartje Kisgyör graslanden
https://goo.gl/maps/GZdQdop7Z2mt1CuC6?g_st=aw

Verslag	Janny
Weersomstandigheden:	Erg warm, tegen de 30 graden
Deelnemers	7
Vervoer naar startpunt	Auto
Verkorte versie	4,5 uur
Afstand	vv 75 km
Moeilijkheidsgraad:	9
Rapportcijfer voor gebied	gem van alle deelnemers een 6

Het rapportcijfer valt laag uit daar na de eerste 500 meter al direct het pad stijgend begon, later het stijgingspercentage opliep met ook nog eens steenslag bedekt waardoor het vrij gevaarlijk werd. Eenmaal bij de graslanden aangekomen die daarna een stijgingspercentage van 30 graden hadden (kruipend op knieën naar boven), bleek ook nog eens dat de graslanden verruigd waren en er weinig biodiversiteit te bespeuren viel. Wel leuk was de vondst van het Rode slangenkruid.

Alleen de eerste 500 meter was prachtig gezien de bloemen- en vlinderrijkdom. Ook hoorden we patrijzen in de naastgelegen akkers en een haas die schrok van ons gezelschap. Leuke plantenvondsten waren het sikkelkruid, de kwee, aarereprijs en ruige anjer.

Deze wandeling is geen aanrader voor volgende kampen; te steil en graslanden op helling moeilijk begaanbaar en ook nog eens verruigd. Zie ook verslag van 10 juni en 14 juni

18 juni Beekdal bij Kisgyör

Excursiegebied Beekdal bij Kisgyör, zie gebeidskaart Kisgyor beekdal 18 juni
https://goo.gl/maps/acbZiJVeH4uwQGwVA?g_st=aw

Verslag	Willem
Weer	later bewolkt, benauwd, ca. 27 graden
Deelnemers	7
Route	Auto ca. 30 km,
Wandeling	4 km, vlak, eenvoudig
Startpunt	Pad in een bocht van de weg om een vijver heen;

	geparkeerd in weilandinrit.
Waardering	mooie wandeling met zeer rijke beekdalgraslanden

Het begon al goed: toen we uit de auto's stapten vloog de keizerarend, en riepen de hop en de draaihals. Eenmaal op het pad parallel aan de beek hadden we links een hoog opgaand eikenbos met opvallend veel wielewalen en rechts het beekdal met een afwisseling van zeggevelden, ruigte en mooie oude wilgenbomen. In die bomen groeiden voor ons nieuwe klimplanten: de Duitse pijp en de stekelaugurk. Op het pad lagen vreemde houten ballen, die knoppengallen van eik bleken te zijn.

Het pad liep in een landje dat erg tegenviel: uitgedroogd, geploegd, begroeid met algemene onkruiden. Het pad liep door, het bos weer in, bij een splitsing namen we het bovenste pad tot we rechts naar beneden naar hooilandjes toe konden doorsteken. Die waren helaas net gemaaid, maar je kon zien dat ze zeer kruidenrijk waren, met veel zaagblad, Noors, geel en glad walstro, herfsttijloos, en nog veel meer. Op niet gemaaide hoekjes vlogen veel insecten, o.a. braam- en purperstreepparelmoervlinder. Ook trapte Anne tot haar schrik nog op een slang (wsch. esculaapslang) van 1,5 meter.

We namen het pad terug, waar diepe sporen in de kleibodem zaten. In sommige van die sporen zaten waterdieren zoals schaatsenrijders, schrijvertjes en bloedzuigers. In één spoor vonden we iets heel bijzonders: leemkieuwpootkreeften, een stuk of twintig. Deze bestaan uit een lichaam met een schild waaronder een groot aantal pootjes bewegen, en een geringde staart met een lange vork aan het eind. Niemand van ons had wel eens zoiets gezien.

Kieuwpootkreeften behoren tot een primitieve groep kreeftachtigen (*Branchiopoden*) die al sinds het Cambrium bestaan. Binnen de B*ranchiopoden* vormen de watervlooien en pekelkreeftjes de grootste groepen. Kieuwpootkreeften behoren tot de onderklasse van de kopschildkreeftjes waarvan wereldwijd maar 16 soorten zijn. Van het genus *Triops*, waartoe het leemkieuwpootkreeftje behoort, zijn fossielen van 351 miljoen jaar oud bekend. Met recht een levend fossiel dus. De naam *Triops* komt van de drie ogen die zij bovenop het kopschild dragen: twee facetogen en één enkelvoudig oog (ocellus). Overigens zijn zij niet verwant aan de degenkrabben, die andere levende fossielen die ook een kop-rugschild en een staart hebben; die zijn eerder verwant aan de spinnen en schorpioenen.

De dieren leven in tijdelijke poelen en worden hooguit een paar maanden oud. Ze laten eieren achter in de poelen, die jarenlange uitdroging overleven en weer uitkomen als de poel zich vult. Ze komen ook in rijstvelden voor. In Nederland worden af en toe, zeer zeldzaam, twee soorten gevonden: *Lepidurus apus* (humuskieuwpootkreeft) en *Triops cancriformis* (leemkieuwpootkreeft). Het levend geraamte (*Chirocephalus diaphanus*) heeft een vergelijkbare levenswijze, maar behoort tot de familie van de pekelkreeftjes (zie Nature Today : Explosie van oerkreeftjes in Het Groene Woud: oranje-blauw zwemmend geraamte massaal en opvallend laat actief.:



Kieuwpootkreeft. Foto: Theo Briggeman

20 juni Beekdal van Kisgyör

Excursiegebied Beekdal van Kisygor, zie oo gebied KisgyÖr 20 juni

Verslag voor beschrijving zie 18 juni
Weer regen en warm
Deelnemers 4
Op zoek naar de Kieuwpootkreeftjes en gevonden (zie ook 18 juni)

Aggtelek

18 juni Aggtelek

Excursiegebied Aggtelek Nationaal park
https://goo.gl/maps/NEN2i8k75W5nSvS59?g_st=aw

Verslag GeertJan
Weer goed wandelweer

Deelnemers	1 , verkenning
Route	via Mikolc naar Aggtelek (plaats) en Josvafö. Via Szin terug: totaal 220 km
Wandeling	bij Josvafö rondwandeling en onderweg veel bloemrijke weilandjes bezocht.
Waardering	8

Lange rit via snelweg en prachtige landelijke wegen tot Josvafö met klein winkeltje. Mooi dorp aan een beekje. Route langs stroompje is ruig, nat, veel vlinders en fraai bos. Doorgelopen tot een van de vele (afgesloten) grotten in dit karstgebied. Goede picknickgelegenheid. Vervolg van de route gemist door met draad afgezet graasgebied voor paarden. Daarbuiten mooie kalkgraslandjes met veel vogels als draaihals, middelste bonte en zwarte specht. Langs de slingerende weg door het dal naar Szin bloemrijke weilandjes. Zijweg links voor Szin naar een restaurantje gaat langs prachtige hellingen, geel van bergvlas, blauw van de verschillende blauwtjes en een mooi palet wilde weit. Prachtig landschap daar, bekend om de vele (door mij niet bezochte) druipsteengrotten.

Waarnemingen

Planten

De waarneming van de planten is op twee manieren beschreven

- In de totaallijst van 412 waargenomen planten
- In de waarnemingen per gebied

Totaallijst waargenomen planten

Soort naam	Wetenschappelijk naam	Familie
Grote waterweegbree	Alisma plantago-aquatica	Alismataceae
Rode ganzenvoet	Oxybasis rubra	Amaranthaceae
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae
Hondspeterselie	Aethusa cynapium	Apiaceae
Anthriscus nitidus	Anthriscus nitidus	Apiaceae
Groot sterrenscherm	Astrantia major	Apiaceae
Bupleurum longifolium	Bupleurum longifolium	Apiaceae
Hertekruid	Cervaria rivini	Apiaceae
Knolribzaad	Chaerophyllum bulbosum	Apiaceae
Dolle kervel	Chaerophyllum temulum	Apiaceae
Gevlekte scheerling	Conium maculatum	Apiaceae
Kruisdistel	Eryngium campestre	Apiaceae
Sikkelkruid	Falcaria vulgaris	Apiaceae
Watertorkruid	Oenanthe aquatica	Apiaceae
Gewone pastinaak	Pastinaca sativa	Apiaceae
Varkensvenkel	Peucedanum officinale	Apiaceae
Bergvarkenskervel	Peucedanum oreoselinum	Apiaceae
Kleine bevernel	Pimpinella saxifraga	Apiaceae
Hertswortel	Seseli libanotis	Apiaceae
Weidekervel	Silaum silaus	Apiaceae
Doorwaskervel	Smyrnium perfoliatum	Apiaceae
Akkerdoornzaad	Torilis arvensis	Apiaceae
Heggendoornzaad	Torilis japonica	Apiaceae
Trinia glauca	Trinia glauca	Apiaceae
Zijdeplant	Asclepias syriaca	Apocynaceae
Witte engbloem	Vincetoxicum hirundinaria	Apocynaceae
Gevlekte aronskelk	Arum maculatum	Araceae
Pijpbloem	Aristolochia clematitis	Aristolochiaceae
Duitse pijp	Aristolochia macrophylla	Aristolochiaceae
Mansoor	Asarum europaeum	Aristolochiaceae
Asperge	Asparagus officinalis	Asparagaceae
Lelietje-van-dalen	Convallaria majalis	Asparagaceae
Dalkruid	Maianthemum bifolium	Asparagaceae

Kuifhyacint	Muscari comosum	Asparagaceae
Piramidevogelmelk	Ornithogalum pyramidale	Asparagaceae
Polygonatum latifolium	Polygonatum latifolium	Asparagaceae
Gewone salomonszegel	Polygonatum multiflorum	Asparagaceae
Kranssalomonszegel	Polygonatum verticillatum	Asparagaceae
Bruine daglelie	Hemerocallis fulva	Asphodelaceae
Steenbreekvaren	Asplenium trichomanes	Aspleniaceae
Blaasvaren	Cystopteris fragilis	Aspleniaceae
Duizendblad	Achillea millefolium	Asteraceae
Edel duizendblad	Achillea nobilis	Asteraceae
Alsemambrosia	Ambrosia artemisiifolia	Asteraceae
Gele kamille	Anthemis tinctoria	Asteraceae
Artemisia santonicum	Artemisia santonicum	Asteraceae
Langstekelige distel	Carduus acanthoides	Asteraceae
Carduus collinus	Carduus collinus	Asteraceae
Kruldistel	Carduus crispus	Asteraceae
Carduus defloratus subsp. sumanus	Carduus defloratus subsp. sumanus	Asteraceae
Knikkende distel	Carduus nutans	Asteraceae
Gemaskerde distel	Carduus personata	Asteraceae
Driedistel	Carlina vulgaris	Asteraceae
Wollige saffloer	Carthamus lanatus	Asteraceae
Grote centaurie	Centaurea scabiosa	Asteraceae
Wilde cichorei	Cichorium intybus	Asteraceae
Grijze vederdistel	Cirsium canum	Asteraceae
Wollige distel	Cirsium eriophorum	Asteraceae
Cirsium pannonicum	Cirsium pannonicum	Asteraceae
Beklierde kogeldistel	Echinops sphaerocephalus	Asteraceae
Zomerfijnstraal	Erigeron annuus	Asteraceae
Koninginnekruid	Eupatorium cannabinum	Asteraceae
Aardpeer	Helianthus tuberosus	Asteraceae
Muurhavikskruid	Hieracium murorum	Asteraceae
Dicht havikskruid	Hieracium vulgatum	Asteraceae
Gevlekt biggenkruid	Hypochaeris maculata	Asteraceae
Engelse alant	Inula britannica	Asteraceae
Inula ensifolia	Inula ensifolia	Asteraceae
Inula hirta	Inula hirta	Asteraceae
Wilgalant	Inula salicina	Asteraceae
Akkerkool	Lapsana communis	Asteraceae
Ruige leeuwentand	Leontodon hispidus	Asteraceae
Muursla	Mycelis muralis	Asteraceae
Wegdistel	Onopordum acanthium	Asteraceae
Muizenoor	Pilosella officinarum	Asteraceae
Schaduwkruiskruid	Senecio ovatus	Asteraceae
Zaagblad	Serratula tinctoria	Asteraceae
Tuilganzenbloem	Tanacetum corymbosum	Asteraceae
Boerenwormkruid	Tanacetum vulgare	Asteraceae

Paardenbloem	Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	Asteraceae
Gele morgenster	Tragopogon pratensis	Asteraceae
Reukeloze kamille	Tripleurospermum inodorum	Asteraceae
Groot springzaad	Impatiens noli-tangere	Balsaminaceae
Klein springzaad	Impatiens parviflora	Balsaminaceae
Zuurbes	Berberis vulgaris	Berberidaceae
Haagbeuk	Carpinus betulus	Betulaceae
Hazelaar	Corylus avellana	Betulaceae
Gewone ossentong	Anchusa officinalis	Boraginaceae
Blauw parelzaad	Buglossoides purpurocaerulea	Boraginaceae
Kleine wasbloem	Cerinthe minor	Boraginaceae
Veldhondstong	Cynoglossum officinale	Boraginaceae
Slangenkruid	Echium vulgare	Boraginaceae
Glad parelzaad	Lithospermum officinale	Boraginaceae
Myosotis sparsiflora	Myosotis sparsiflora	Boraginaceae
Nonea pulla	Nonea pulla	Boraginaceae
Pontechium maculatum	Pontechium maculatum	Boraginaceae
Ongevlekt longkruid	Pulmonaria obscura	Boraginaceae
Gewone smeerwortel	Symphytum officinale	Boraginaceae
Look-zonder-look	Alliaria petiolata	Brassicaceae
Bolletjeskers	Cardamine bulbifera	Brassicaceae
Muurbloemmosterd s.s.	Coincya monensis subsp. cheiranthos	Brassicaceae
Sofiekruid	Descurainia sophia	Brassicaceae
Draba nemorosa	Draba nemorosa	Brassicaceae
Stijve steenraket	Erysimum virgatum	Brassicaceae
Damastbloem	Hesperis matronalis	Brassicaceae
Veldkruidkers	Lepidium campestre	Brassicaceae
Pijlkruidkers	Lepidium draba	Brassicaceae
Doorgroeide kruidkers	Lepidium perfoliatum	Brassicaceae
Wilde judaspenning	Lunaria rediviva	Brassicaceae
Torenscheefkelk	Pseudoturritis turrita	Brassicaceae
Akkerkers	Rorippa sylvestris	Brassicaceae
Hoge raket	Sisymbrium strictissimum	Brassicaceae
Klein tasjeskruid	Teesdalia nudicaulis	Brassicaceae
Torenkruid	Turritis glabra	Brassicaceae
Zwanenbloem	Butomus umbellatus	Butomaceae
Weideklokje	Campanula patula	Campanulaceae
Prachtklokje	Campanula persicifolia	Campanulaceae
Rapunzelklokje	Campanula rapunculus	Campanulaceae
Campanula sibirica	Campanula sibirica	Campanulaceae
Ruig klokje	Campanula trachelium	Campanulaceae
Hop	Humulus lupulus	Cannabaceae
Grote kaardenbol	Dipsacus fullonum	Caprifoliaceae
Slipbladkaardenbol	Dipsacus laciniatus	Caprifoliaceae
Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	Caprifoliaceae
Beemdkroon	Knautia arvensis	Caprifoliaceae

Rode kamperfoelie	Lonicera xylosteum	Caprifoliaceae
Gele scabiosa	Scabiosa ochroleuca	Caprifoliaceae
Gewone sneeuwbes	Symphoricarpos albus	Caprifoliaceae
Echte valeriaan	Valeriana officinalis	Caprifoliaceae
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae
Kartuizer anjer	Dianthus carthusianorum	Caryophyllaceae
Steenanjer	Dianthus deltoides	Caryophyllaceae
Drienerfmuur	Moehringia trinervia	Caryophyllaceae
Slanke mantelanjer	Petrorhagia prolifera	Caryophyllaceae
Kleine mantelanjer	Petrorhagia saxifraga	Caryophyllaceae
Zeepkruid	Saponaria officinalis	Caryophyllaceae
Eenjarige hardbloem	Scleranthus annuus	Caryophyllaceae
Prikneus	Silene coronaria	Caryophyllaceae
Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi	Caryophyllaceae
Avondkoekoeksbloem	Silene latifolia	Caryophyllaceae
Nachtsilene	Silene nutans	Caryophyllaceae
Oorsilene	Silene otites	Caryophyllaceae
Rode pekanjer	Silene viscaria	Caryophyllaceae
Blaassilene	Silene vulgaris	Caryophyllaceae
Watermuur	Stellaria aquatica	Caryophyllaceae
Grasmuur	Stellaria graminea	Caryophyllaceae
Grote muur	Stellaria holostea	Caryophyllaceae
Euonymus verrucosus	Euonymus verrucosus	Celastraceae
Grof hoornblad	Ceratophyllum demersum	Ceratophyllaceae
Geel zonneroosje	Helianthemum nummularium	Cistaceae
Herfsttijloos	Colchicum autumnale	Colchicaceae
Akkerwinde	Convolvulus arvensis	Convolvulaceae
Rode kornoelje	Cornus sanguinea	Cornaceae
Muurpeper	Sedum acre	Crassulaceae
Wit vetkruid	Sedum album	Crassulaceae
Zacht vetkruid	Sedum sexangulare	Crassulaceae
Donderblad	Sempervivum tectorum	Crassulaceae
Heggenrank	Bryonia dioica	Cucurbitaceae
Stekelaugurk	Echinocystis lobata	Cucurbitaceae
Jeneverbes	Juniperus communis	Cupressaceae
Heen	Bolboschoenus maritimus	Cyperaceae
Moeraszegge	Carex acutiformis	Cyperaceae
IJle bermzegge	Carex divulsa	Cyperaceae
Ruige zegge	Carex hirta	Cyperaceae
Valse voszegge	Carex otrubae	Cyperaceae
Bleke zegge	Carex pallescens	Cyperaceae
IJle zegge	Carex remota	Cyperaceae
Gewone bermzegge	Carex spicata	Cyperaceae
Boszegge	Carex sylvatica	Cyperaceae
Mattenbies	Schoenoplectus lacustris	Cyperaceae
Bosbies	Scirpus sylvaticus	Cyperaceae
Amandelwolfsmelk	Euphorbia amygdaloides	Euphorbiaceae
Cipreswolfsmelk	Euphorbia cyparissias	Euphorbiaceae

Heksenmelk	Euphorbia esula	Euphorbiaceae
Kroontjeskruid	Euphorbia helioscopia	Euphorbiaceae
Euphorbia lucida	Euphorbia lucida	Euphorbiaceae
Euphorbia salicifolia	Euphorbia salicifolia	Euphorbiaceae
Bosbingelkruid	Mercurialis perennis	Euphorbiaceae
Valse indigo	Amorpha fruticosa	Fabaceae
Wondklaver	Anthyllis vulneraria	Fabaceae
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica	Anthyllis vulneraria subsp. carpatica	Fabaceae
Bergerwt	Astragalus cicer	Fabaceae
Hokjespeul	Astragalus glycyphyllos	Fabaceae
Chamaecytisus albus	Chamaecytisus albus	Fabaceae
Zwarte brem	Cytisus nigricans	Fabaceae
Verfbrem	Genista tinctoria	Fabaceae
Duits zoethout	Glycyrrhiza echinata	Fabaceae
Brede lathyrus	Lathyrus latifolius	Fabaceae
Graslathyrus	Lathyrus nissolia	Fabaceae
Veldlathyrus	Lathyrus pratensis	Fabaceae
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae
Voorjaarslathyrus	Lathyrus vernus	Fabaceae
Lotus conjugatus	Lotus conjugatus	Fabaceae
Gewone rolklaver	Lotus corniculatus	Fabaceae
Lotus dorycnium	Lotus dorycnium	Fabaceae
Lotus herbaceus	Lotus herbaceus	Fabaceae
Sikkelklaver	Medicago falcata	Fabaceae
Luzerne	Medicago sativa	Fabaceae
Bonte luzerne	Medicago x varia (M. falcata x M. sativa)	Fabaceae
Citroengele honingklaver	Melilotus officinalis	Fabaceae
Kattendoorn	Ononis spinosa	Fabaceae
Bont kroonkruid	Securigera varia	Fabaceae
Alpenklaver	Trifolium alpestre	Fabaceae
Hazenpootje	Trifolium arvense	Fabaceae
Liggende klaver	Trifolium campestre	Fabaceae
Bochtige klaver	Trifolium medium	Fabaceae
Bergklaver	Trifolium montanum	Fabaceae
Geelwitte klaver	Trifolium ochroleucon	Fabaceae
Rode klaver	Trifolium pratense	Fabaceae
Purperen klaver	Trifolium rubens	Fabaceae
Gestreepte klaver	Trifolium striatum	Fabaceae
Vicia cassubica	Vicia cassubica	Fabaceae
Grote wikke	Vicia grandiflora	Fabaceae
Ringelwikke	Vicia hirsuta	Fabaceae
Gele wikke	Vicia lutea	Fabaceae
Hongaarse wikke	Vicia pannonica	Fabaceae
Erwtbladige wikke	Vicia pisiformis	Fabaceae
Heggenwikke	Vicia sepium	Fabaceae
Stijve wikke	Vicia tenuifolia	Fabaceae

Beuk	Fagus sylvatica	Fagaceae
Moseik	Quercus cerris	Fagaceae
Echt duizendguldenkruid	Centaurium erythraea	Gentianaceae
Kruisbladgentiaan	Gentiana cruciata	Gentianaceae
Donkere ooievaarsbek	Geranium phaeum	Geraniaceae
Bloedooievaarsbek	Geranium sanguineum	Geraniaceae
Kikkerbeet	Hydrocharis morsus-ranae	Hydrocharitaceae
Ruig hertshooi	Hypericum hirsutum	Hypericaceae
Sint-Janskruid	Hypericum perforatum	Hypericaceae
Iris graminea	Iris graminea	Iridaceae
Siberische lis	Iris sibirica	Iridaceae
Iris variegata	Iris variegata	Iridaceae
Pitrus	Juncus effusus	Juncaceae
Witte veldbies	Luzula luzuloides	Juncaceae
Veelbloemige veldbies	Luzula multiflora	Juncaceae
Harig zenegroen	Ajuga genevensis	Lamiaceae
Kruipend zenegroen	Ajuga reptans	Lamiaceae
Stinkende ballote	Ballota nigra	Lamiaceae
Betonie	Betonica officinalis	Lamiaceae
Borstelkrans	Clinopodium vulgare	Lamiaceae
Gele dovenetel	Lamiastrum galeobdolon	Lamiaceae
Gevlekte dovenetel	Lamium maculatum	Lamiaceae
Hartgespan	Leonurus cardiaca	Lamiaceae
Lycopus exaltatus	Lycopus exaltatus	Lamiaceae
Wilde marjolein	Origanum vulgare	Lamiaceae
Phlomis tuberosa	Phlomis tuberosa	Lamiaceae
Witte brunel	Prunella laciniata	Lamiaceae
Gewone brunel	Prunella vulgaris	Lamiaceae
Bossalie	Salvia nemorosa	Lamiaceae
Veldsalie	Salvia pratensis	Lamiaceae
Kranssalie	Salvia verticillata	Lamiaceae
Groot glidkruid	Scutellaria altissima	Lamiaceae
Trosglidkruid	Scutellaria columnae	Lamiaceae
Blauw glidkruid	Scutellaria galericulata	Lamiaceae
Scutellaria hastifolia	Scutellaria hastifolia	Lamiaceae
Duitse andoorn	Stachys germanica	Lamiaceae
Stachys germanica subsp. germanica	Stachys germanica subsp. germanica	Lamiaceae
Bergandoorn	Stachys recta	Lamiaceae
Bosandoorn	Stachys sylvatica	Lamiaceae
Echte gamander	Teucrium chamaedrys	Lamiaceae
Berggamander	Teucrium montanum	Lamiaceae
Thymus pannonicus	Thymus pannonicus	Lamiaceae
Grote tijm	Thymus pulegioides	Lamiaceae
Loos blaasjeskruid	Utricularia australis	Lentibulariaceae
Roggelelie	Lilium bulbiferum	Liliaceae
Turkse lelie	Lilium martagon	Liliaceae
Geelhartje	Linum catharticum	Linaceae

Geel vlas	Linum flavum	Linaceae
Linum hirsutum	Linum hirsutum	Linaceae
Smal vlas	Linum tenuifolium	Linaceae
Waternoot	Trapa natans	Lythraceae
Heemst	Althaea officinalis	Malvaceae
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Malvaceae
Eenbes	Paris quadrifolia	Melanthiaceae
Vijgenboom	Ficus carica	Moraceae
Es	Fraxinus excelsior	Oleaceae
Groot heksenkruid	Circaea lutetiana	Onagraceae
Bleek bosvogeltje	Cephalanthera damasonium	Orchidaceae
Rood bosvogeltje	Cephalanthera rubra	Orchidaceae
Vrouwenschoentje	Cypripedium calceolus	Orchidaceae
Brede wespenorchis	Epipactis helleborine	Orchidaceae
Grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea	Orchidaceae
Aangebrande orchis	Neotinea ustulata	Orchidaceae
Vogelnestje	Neottia nidus-avis	Orchidaceae
Purperorchis	Orchis purpurea	Orchidaceae
Welriekende nachtorchis	Platanthera bifolia	Orchidaceae
Bergnachtorchis	Platanthera chlorantha	Orchidaceae
Melampyrum barbatum	Melampyrum barbatum	Orobanchaceae
Kamzwartkoren	Melampyrum cristatum	Orobanchaceae
Paarse hengel	Melampyrum nemorosum	Orobanchaceae
Walstrobremraap	Orobanche caryophyllacea	Orobanchaceae
Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius	Orobanchaceae
Kleine ratelaar	Rhinanthus minor	Orobanchaceae
Witte klaverzuring	Oxalis acetosella	Oxalidaceae
Grote klaproos	Papaver rhoeas	Papaveraceae
Grootbloemig vingerhoedskruid	Digitalis grandiflora	Plantaginaceae
Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea	Plantaginaceae
Genadekruid	Gratiola officinalis	Plantaginaceae
Linaria genistifolia	Linaria genistifolia	Plantaginaceae
Vlasbekje	Linaria vulgaris	Plantaginaceae
Ruige weegbree	Plantago media	Plantaginaceae
Brede ereprijs	Veronica austriaca	Plantaginaceae
Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys	Plantaginaceae
Lange ereprijs	Veronica longifolia	Plantaginaceae
Aarereprijs	Veronica spicata	Plantaginaceae
Veronica spicata subsp. orchidea	Veronica spicata subsp. orchidea	Plantaginaceae
Limonium gmelini subsp. hungaricum	Limonium gmelini subsp. hungaricum	Plumbaginaceae
Gewoon reukgras	Anthoxanthum odoratum	Poaceae
Glanshaver	Arrhenatherum elatius	Poaceae
Zachte haver	Avenula pubescens	Poaceae
Gevinde kortsteel	Brachypodium pinnatum	Poaceae
Boskortsteel	Brachypodium sylvaticum	Poaceae
Bevertjes	Briza media	Poaceae
Kweekdravik	Bromopsis inermis	Poaceae

Duinriet	Calamagrostis epigejos	Poaceae
Celtica gigantea	Celtica gigantea	Poaceae
Buntgras	Corynephorus canescens	Poaceae
Handjesgras	Cynodon dactylon	Poaceae
Hondstarwegras	Elymus caninus	Poaceae
Elymus hispidus	Elymus hispidus	Poaceae
Boszwenkgras	Festuca altissima	Poaceae
Hordeum hystrix	Hordeum hystrix	Poaceae
Smal fakkelgras	Koeleria macrantha	Poaceae
Wimperparelgras	Melica ciliata	Poaceae
Eenbloemig parelgras	Melica uniflora	Poaceae
Bosgierstgras	Milium effusum	Poaceae
Gewoon timoteegras	Phleum pratense	Poaceae
Piptatherum virescens	Piptatherum virescens	Poaceae
Schaduwgras	Poa nemoralis	Poaceae
Reuzenzwenkgras	Schedonorus giganteus	Poaceae
Vedergras	Stipa pennata	Poaceae
Goudhaver	Trisetum flavescens	Poaceae
Kuifvleugeltjesbloem	Polygala comosa	Polygalaceae
Polygala major	Polygala major	Polygalaceae
Gewone vleugeltjesbloem	Polygala vulgaris	Polygalaceae
Zwaluwtong	Fallopia convolvulus	Polygonaceae
Waterpeper	Persicaria hydropiper	Polygonaceae
Schapenzuring	Rumex acetosella	Polygonaceae
Krulzuring	Rumex crispus	Polygonaceae
Eikvaren spec.	Polypodium spec.	Polypodiaceae
Postelein	Portulaca oleracea	Portulacaceae
Gekroesd fonteinkruid	Potamogeton crispus	Potamogetonacea e
Boswederik	Lysimachia nemorum	Primulaceae
Penningkruid	Lysimachia nummularia	Primulaceae
Grote wederik	Lysimachia vulgaris	Primulaceae
Slanke sleutelbloem	Primula elatior	Primulaceae
Christoffelkruid	Actaea spicata	Ranunculaceae
Zomeradonis	Adonis aestivalis	Ranunculaceae
Struikclematis	Clematis integrifolia	Ranunculaceae
Bosrank	Clematis vitalba	Ranunculaceae
Valse ridderspoor	Consolida ajacis	Ranunculaceae
Wilde ridderspoor	Consolida regalis	Ranunculaceae
Purper nieskruid	Helleborus purpurascens	Ranunculaceae
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	Ranunculaceae
Knolboterbloem	Ranunculus bulbosus	Ranunculaceae
Wollige boterbloem	Ranunculus lanuginosus	Ranunculaceae
Bosboterbloem	Ranunculus polyanthemos	Ranunculaceae
Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus	Ranunculaceae
Thalictrum lucidum	Thalictrum lucidum	Ranunculaceae
Wilde reseda	Reseda lutea	Resedaceae
Sporkehout	Frangula alnus	Rhamnaceae


Gewone agrimonie	Agrimonia eupatoria	Rosaceae
Kwee	Cydonia oblonga	Rosaceae
Moerasspirea	Filipendula ulmaria	Rosaceae
Knolspirea	Filipendula vulgaris	Rosaceae
Geel nagelkruid	Geum urbanum	Rosaceae
Viltganzerik	Potentilla argentea	Rosaceae
Tormentil	Potentilla erecta	Rosaceae
Rechte ganzerik	Potentilla recta	Rosaceae
Kleine pimpernel	Poterium sanguisorba	Rosaceae
Weichselboom	Prunus mahaleb	Rosaceae
Wilde peer	Pyrus pyraster	Rosaceae
Duinroos	Rosa spinosissima	Rosaceae
Meelbes	Sorbus aria	Rosaceae
Wilde lijsterbes	Sorbus aucuparia	Rosaceae
Tamme lijsterbes	Sorbus domestica	Rosaceae
Elsbes	Sorbus torminalis	Rosaceae
Kalkbedstro	Asperula cynanchica	Rubiaceae
Kruisbladwalstro	Cruciata laevipes	Rubiaceae
Noords walstro	Galium boreale	Rubiaceae
Glad walstro	Galium mollugo	Rubiaceae
Lievevrouwebedstro	Galium odoratum	Rubiaceae
Moeraswalstro	Galium palustre	Rubiaceae
Boswalstro	Galium sylvaticum	Rubiaceae
Geel walstro	Galium verum	Rubiaceae
Vuurwerkplant	Dictamnus albus	Rutaceae
Zwarte populier	Populus nigra	Salicaceae
Grote vlotvaren	Salvinia molesta	Salviniaceae
Thesium linophyllon	Thesium linophyllon	Santalaceae
Spaanse aak	Acer campestre	Sapindaceae
Vederesdoorn	Acer negundo	Sapindaceae
Noorse esdoorn	Acer platanoides	Sapindaceae
Tataarse esdoorn	Acer tataricum	Sapindaceae
Verspreidbladig goudveil	Chrysosplenium alternifolium	Saxifragaceae
Knopig helmkruid	Scrophularia nodosa	Scrophulariaceae
Mottenkruid	Verbascum blattaria	Scrophulariaceae
Melige toorts	Verbascum lychnitis	Scrophulariaceae
Zwarte toorts	Verbascum nigrum	Scrophulariaceae
Paarse toorts	Verbascum phoeniceum	Scrophulariaceae
Wolfskers	Atropa bella-donna	Solanaceae
Boksdoorn	Lycium barbarum	Solanaceae
Klokbilzekruid	Scopolia carniolica	Solanaceae
Pimpernoot	Staphylea pinnata	Staphyleaceae
Rood peperboompje	Daphne mezereum	Thymelaeaceae
Groot glaskruid	Parietaria officinalis	Urticaceae
IJzerhard	Verbena officinalis	Verbenaceae
Kruidvlier	Sambucus ebulus	Viburnaceae
Gewone vlier	Sambucus nigra	Viburnaceae
Wollige sneeuwbal	Viburnum lantana	Viburnaceae

Akkervioolje	Viola arvensis	Violaceae
Rotsvioolje	Viola tricolor subsp. saxatilis	Violaceae
Valse Wingerd	Parthenocissus inserta	Vitaceae
Wijnstok	Vitis vinifera	Vitaceae
Totaal		**412**

Waarnemingen planten per gebied - gebiedskaartjes

Gebied: Latorpuszta rondje vanaf de camping.

Datum: 8-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Knolribzaad	Chaerophyllum bulbosum	Apiaceae	https://observation.org/observation/403881333/
Pijpbloem	Aristolochia clematitis	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/404103309/
Kuifhyacint	Muscari comosum	Asparagaceae	https://observation.org/observation/403881397/
Edel duizendblad	Achillea nobilis	Asteraceae	https://observation.org/observation/403812210/
Knikkende distel	Carduus nutans	Asteraceae	https://observation.org/observation/403841225/
Zomerfijnstraal	Erigeron annuus	Asteraceae	https://observation.org/observation/403820861/
Inula hirta	Inula hirta	Asteraceae	https://observation.org/observation/403816027/
Veldkruidkers	Lepidium campestre	Brassicaceae	https://observation.org/observation/403881742/
Pijlkruidkers	Lepidium draba	Brassicaceae	https://observation.org/observation/403881456/


Hoge raket	Sisymbrium strictissimum	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404119803/
Klein tasjeskruid	Teesdalia nudicaulis	Brassicaceae	https://observation.org/observation/403837598/
Prachtklokje	Campanula persicifolia	Campanulaceae	https://observation.org/observation/403849210/
Hop	Humulus lupulus	Cannabaceae	https://observation.org/observation/403881398/
Beemdkroon	Knautia arvensis	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/403794527/
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403831530/
Kartuizer anjer	Dianthus carthusianorum	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403824192/
Slanke mantelanjer	Petrorhagia prolifera	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403813745/
Kleine mantelanjer	Petrorhagia saxifraga	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403839297/
Prikneus	Silene coronaria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403809493/
Nachtsilene	Silene nutans	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403794380/
Oorsilene	Silene otites	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403841984/
Rode pekanjer	Silene viscaria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403848293/
Herfsttijloos	Colchicum autumnale	Colchicaceae	https://observation.org/observation/403834104/
Zacht vetkruid	Sedum sexangulare	Crassulaceae	https://observation.org/observation/403834300/
Ruige zegge	Carex hirta	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404102802/
Bosbies	Scirpus sylvaticus	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404103334/
Cipreswolfsmelk	Euphorbia cyparissias	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/403808246/
Bergerwt	Astragalus cicer	Fabaceae	https://observation.org/observation/403793942/
Verfbrem	Genista tinctoria	Fabaceae	https://observation.org/observation/403834960/
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae	https://observation.org/observation/403816371/
Lotus dorycnium	Lotus dorycnium	Fabaceae	https://observation.org/observation/403819963/
Bont kroonkruid	Securigera varia	Fabaceae	https://observation.org/observation/403811033/
Hazenpootje	Trifolium arvense	Fabaceae	https://observation.org/observation/403881517/
Liggende klaver	Trifolium campestre	Fabaceae	https://observation.org/observation/403881578/
Bergklaver	Trifolium montanum	Fabaceae	https://observation.org/observation/403827595/

Geelwitte klaver	Trifolium ochroleucon	Fabaceae	https://observation.org/observation/403811462/
Gestreepte klaver	Trifolium striatum	Fabaceae	https://observation.org/observation/403815560/
Grote wikke	Vicia grandiflora	Fabaceae	https://observation.org/observation/403793756/
Hongaarse wikke	Vicia pannonica	Fabaceae	https://observation.org/observation/403818236/
Moseik	Quercus cerris	Fagaceae	https://observation.org/observation/403843920/
Bloedooievaarsbek	Geranium sanguineum	Geraniaceae	https://observation.org/observation/403833198/
Borstelkrans	Clinopodium vulgare	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403881716/
Gevlekte dovenetel	Lamium maculatum	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403881419/
Witte brunel	Prunella laciniata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403826598/
Bossalie	Salvia nemorosa	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403931033/
Kranssalie	Salvia verticillata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403881344/
Echte gamander	Teucrium chamaedrys	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403808075/
Thymus pannonicus	Thymus pannonicus	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403795544/
Geelhartje	Linum catharticum	Linaceae	https://observation.org/observation/404103332/
Welriekende nachtorchis	Platanthera bifolia	Orchidaceae	https://observation.org/observation/403822783/
Bergnachtorchis	Platanthera chlorantha	Orchidaceae	https://observation.org/observation/403905415/
Melampyrum barbatum	Melampyrum barbatum	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/403810568/
Linaria genistifolia	Linaria genistifolia	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/403832779/
Ruige weegbree	Plantago media	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/403881573/
Bevertjes	Briza media	Poaceae	https://observation.org/observation/403825907/
Elymus hispidus	Elymus hispidus	Poaceae	https://observation.org/observation/403836432/
Wimperparelgras	Melica ciliata	Poaceae	https://observation.org/observation/403833006/
Vedergras	Stipa pennata	Poaceae	https://observation.org/observation/403823799/
Gewone vleugeltjesbloem	Polygala vulgaris	Polygalaceae	https://observation.org/observation/403821948/
Schapenzuring	Rumex acetosella	Polygonaceae	https://observation.org/observation/403881422/

Boswederik	Lysimachia nemorum	Primulaceae	https://observation.org/observation/404103323/
Wilde ridderspoor	Consolida regalis	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/403814152/
Gewone agrimonie	Agrimonia eupatoria	Rosaceae	https://observation.org/observation/403817100/
Kwee	Cydonia oblonga	Rosaceae	https://observation.org/observation/403881383/
Knolspirea	Filipendula vulgaris	Rosaceae	https://observation.org/observation/403821593/
Viltganzerik	Potentilla argentea	Rosaceae	https://observation.org/observation/403809022/
Kleine pimpernel	Poterium sanguisorba	Rosaceae	https://observation.org/observation/403839578/
Kruidvlier	Sambucus ebulus	Viburnaceae	https://observation.org/observation/404103328/

Gebied: Cserepfalu grasland

Datum: 9-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijk naam	Familie	link naar waarneming
Driedistel	Carlina vulgaris	Asteraceae	https://observation.org/observation/404098565/
Gewone ossentong	Anchusa officinalis	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404097929/
Veldhondstong	Cynoglossum officinale	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404099274/
Glad parelzaad	Lithospermum officinale	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404027755/
Rapunzelklokje	Campanula rapunculus	Campanulaceae	https://observation.org/observation/404000827/
Grasmuur	Stellaria graminea	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/403993397/
Moeraszegge	Carex acutiformis	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404103347/
Gewone bermzegge	Carex spicata	Cyperaceae	https://observation.org/observation/403997891/
Hokjespeul	Astragalus glycyphyllos	Fabaceae	https://observation.org/observation/404098173/
Alpenklaver	Trifolium alpestre	Fabaceae	https://observation.org/observation/404099089/
Bochtige klaver	Trifolium medium	Fabaceae	https://observation.org/observation/404098339/
Vicia cassubica	Vicia cassubica	Fabaceae	https://observation.org/observation/404100291/
Harig zenegroen	Ajuga genevensis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403996797/
Hartgespan	Leonurus cardiaca	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404025722/
Veldsalie	Salvia pratensis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404095715/

Groot glidkruid	Scutellaria altissima	Lamiaceae	https://observation.org/observation/403994343/
Duitse andoorn	Stachys germanica	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404024542/
Grote tijm	Thymus pulegioides	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404097854/
Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/403995940/
Grootbloemig vingerhoedskruid	Digitalis grandiflora	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/404100765/
Piptatherum virescens	Piptatherum virescens	Poaceae	https://observation.org/observation/404119843/
Polygala major	Polygala major	Polygalaceae	https://observation.org/observation/404021345/
Wilde peer	Pyrus pyraster	Rosaceae	https://observation.org/observation/403998836/
Kruisbladwalstro	Cruciata laevipes	Rubiaceae	https://observation.org/observation/403996031/
Tataarse esdoorn	Acer tataricum	Sapindaceae	https://observation.org/observation/403995285/

Gebied: Cserepfalu dal vanaf bezoekerscentrum

Datum: 9-6-2026

Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Hertswortel	Seseli libanotis	Apiaceae	https://observation.org/observation/404149924/
Doorwaskervel	Smyrnium perfoliatum	Apiaceae	https://observation.org/observation/404158753/
Witte engbloem	Vincetoxicum hirundinaria	Apocynaceae	https://observation.org/observation/404149992/
Pijpbloem	Aristolochia clematitis	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/404149826/
Akkerkool	Lapsana communis	Asteraceae	https://observation.org/observation/404149823/
Hoge raket	Sisymbrium strictissimum	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404149819/
Ruig klokje	Campanula trachelium	Campanulaceae	https://observation.org/observation/404149961/
Hop	Humulus lupulus	Cannabaceae	https://observation.org/observation/404149820/
Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404158750/
Rode kamperfoelie	Lonicera xylosteum	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404150003/
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404158764/

Prikneus	Silene coronaria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404150044/
Geel zonneroosje	Helianthemum nummularium	Cistaceae	https://observation.org/observation/404149986/
Rode kornoelje	Cornus sanguinea	Cornaceae	https://observation.org/observation/404149829/
Wit vetkruid	Sedum album	Crassulaceae	https://observation.org/observation/404149991/
Zwarte brem	Cytisus nigricans	Fabaceae	https://observation.org/observation/404149984/
Brede lathyrus	Lathyrus latifolius	Fabaceae	https://observation.org/observation/404149970/
Graslathyrus	Lathyrus nissolia	Fabaceae	https://observation.org/observation/404150066/
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae	https://observation.org/observation/404149830/
Voorjaarslathyrus	Lathyrus vernus	Fabaceae	https://observation.org/observation/404158759/
Sikkelklaver	Medicago falcata	Fabaceae	https://observation.org/observation/404149929/
Bochtige klaver	Trifolium medium	Fabaceae	https://observation.org/observation/404150037/
Stinkende ballote	Ballota nigra	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404149757/
Betonie	Betonica officinalis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404150062/
Kranssalie	Salvia verticillata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404150009/
Trosglidkruid	Scutellaria columnae	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404149999/
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Malvaceae	https://observation.org/observation/404149788/
Purperorchis	Orchis purpurea	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404158756/
Ruige weegbree	Plantago media	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/404150007/
Bosgierstgras	Milium effusum	Poaceae	https://observation.org/observation/404150033/
Bosrank	Clematis vitalba	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404149824/
Gewone agrimonie	Agrimonia eupatoria	Rosaceae	https://observation.org/observation/404149832/
Moerasspirea	Filipendula ulmaria	Rosaceae	https://observation.org/observation/404149925/
Knolspirea	Filipendula vulgaris	Rosaceae	https://observation.org/observation/404150042/
Viltganzerik	Potentilla argentea	Rosaceae	https://observation.org/observation/404149939/
Kruisbladwalstro	Cruciata laevipes	Rubiaceae	https://observation.org/observation/404150039/
Pimpernoot	Staphylea pinnata	Staphyleaceae	https://observation.org/observation/404158766/

Groot glaskruid	Parietaria officinalis	Urticaceae	https://observation.org/observation/404149822/
Kruidvlier	Sambucus ebulus	Viburnaceae	https://observation.org/observation/404150024/

Gebied: Bukkzserc

Datum: 10-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Kruisdistel	Eryngium campestre	Apiaceae	https://observation.org/observation/404196863/
Sikkelkruid	Falcaria vulgaris	Apiaceae	https://observation.org/observation/404166580/
Hertswortel	Seseli libanotis	Apiaceae	https://observation.org/observation/404185336/
Weidekervel	Silaum silaus	Apiaceae	https://observation.org/observation/404166338/
Trinia glauca	Trinia glauca	Apiaceae	https://observation.org/observation/404170422/
Zijdeplant	Asclepias syriaca	Apocynaceae	https://observation.org/observation/404160048/
Witte engbloem	Vincetoxicum hirundinaria	Apocynaceae	https://observation.org/observation/404195573/
Piramidevogelmelk	Ornithogalum pyramidale	Asparagaceae	https://observation.org/observation/404198529/
Alsemambrosia	Ambrosia artemisiifolia	Asteraceae	https://observation.org/observation/404163186/
Langstekelige distel	Carduus acanthoides	Asteraceae	https://observation.org/observation/404171341/
Kruldistel	Carduus crispus	Asteraceae	https://observation.org/observation/404162141/
Grote centaurie	Centaurea scabiosa	Asteraceae	https://observation.org/observation/404157752/
Cirsium pannonicum	Cirsium pannonicum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404189259/


Gevlekt biggenkruid	Hypochaeris maculata	Asteraceae	https://observation.org/observation/404204895/
Wilgalant	Inula salicina	Asteraceae	https://observation.org/observation/404198923/
Muizenoor	Pilosella officinarum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404182675/
Tuilganzenbloem	Tanacetum corymbosum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404188653/
Kleine wasbloem	Cerinthe minor	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404201174/
Slangenkruid	Echium vulgare	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404215549/
Nonea pulla	Nonea pulla	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404159085/
Sofiekruid	Descurainia sophia	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404161272/
Campanula sibirica	Campanula sibirica	Campanulaceae	https://observation.org/observation/404193344/
Grote kaardenbol	Dipsacus fullonum	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404173614/
Gele scabiosa	Scabiosa ochroleuca	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404212054/
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404172802/
Kartuizer anjer	Dianthus carthusianorum	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404197272/
Blaassilene	Silene vulgaris	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404183124/
Jeneverbes	Juniperus communis	Cupressaceae	https://observation.org/observation/404186788/
Heksenmelk	Euphorbia esula	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/404157991/
Kroontjeskruid	Euphorbia helioscopia	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/404162645/
Wondklaver	Anthyllis vulneraria	Fabaceae	https://observation.org/observation/404177682/
Bergerwt	Astragalus cicer	Fabaceae	https://observation.org/observation/404201700/
Chamaecytisus albus	Chamaecytisus albus	Fabaceae	https://observation.org/observation/404211520/
Zwarte brem	Cytisus nigricans	Fabaceae	https://observation.org/observation/404178796/
Brede lathyrus	Lathyrus latifolius	Fabaceae	https://observation.org/observation/404203399/
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae	https://observation.org/observation/404202936/
Sikkelklaver	Medicago falcata	Fabaceae	https://observation.org/observation/404159878/
Citroengele honingklaver	Melilotus officinalis	Fabaceae	https://observation.org/observation/404156975/
Kattendoorn	Ononis spinosa	Fabaceae	https://observation.org/observation/404203803/

Purperen klaver	Trifolium rubens	Fabaceae	https://observation.org/observation/404197376/
Bloedooievaarsbek	Geranium sanguineum	Geraniaceae	https://observation.org/observation/404193732/
Betonie	Betonica officinalis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404184940/
Phlomis tuberosa	Phlomis tuberosa	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404159745/
Bossalie	Salvia nemorosa	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404156333/
Veldsalie	Salvia pratensis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404191251/
Kranssalie	Salvia verticillata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404156124/
Scutellaria hastifolia	Scutellaria hastifolia	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404169589/
Bergandoorn	Stachys recta	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404212500/
Echte gamander	Teucrium chamaedrys	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404205569/
Geelhartje	Linum catharticum	Linaceae	https://observation.org/observation/404174650/
Geel vlas	Linum flavum	Linaceae	https://observation.org/observation/404176691/
Linum hirsutum	Linum hirsutum	Linaceae	https://observation.org/observation/404177435/
Smal vlas	Linum tenuifolium	Linaceae	https://observation.org/observation/404196282/
Vrouwenschoentje	Cypripedium calceolus	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404190769/
Grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404190092/
Kamzwartkoren	Melampyrum cristatum	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/404200379/
Grote klaproos	Papaver rhoeas	Papaveraceae	https://observation.org/observation/404173327/
Brede ereprijs	Veronica austriaca	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/404175568/
Gevinde kortsteel	Brachypodium pinnatum	Poaceae	https://observation.org/observation/404175036/
Kweekdravik	Bromopsis inermis	Poaceae	https://observation.org/observation/404155969/
Zomeradonis	Adonis aestivalis	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404163765/
Struikclematis	Clematis integrifolia	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404183492/
Thalictrum lucidum	Thalictrum lucidum	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404186136/
Wilde reseda	Reseda lutea	Resedaceae	https://observation.org/observation/404156579/
Sporkehout	Frangula alnus	Rhamnaceae	https://observation.org/observation/404185591/

Rechte ganzerik	Potentilla recta	Rosaceae	https://observation.org/observation/404172033/
Tamme lijsterbes	Sorbus domestica	Rosaceae	https://observation.org/observation/404207047/
Vuurwerkplant	Dictamnus albus	Rutaceae	https://observation.org/observation/404195108/
Thesium linophyllon	Thesium linophyllon	Santalaceae	https://observation.org/observation/404187310/
Mottenkruid	Verbascum blattaria	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/404167133/
Zwarte toorts	Verbascum nigrum	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/404171590/
IJzerhard	Verbena officinalis	Verbenaceae	https://observation.org/observation/404156732/
Kruidvlier	Sambucus ebulus	Viburnaceae	https://observation.org/observation/404160913/
Akkervioolтje	Viola arvensis	Violaceae	https://observation.org/observation/404161109/

Gebied: Kleine Hortobagy

Datum: 11-6-2026




Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Rode ganzenvoet	Oxybasis rubra	Amaranthaceae	https://observation.org/observation/404466945/
Gevlekte scheerling	Conium maculatum	Apiaceae	https://observation.org/observation/404350571/
Sikkelkruid	Falcaria vulgaris	Apiaceae	https://observation.org/observation/404359772/
Watertorkruid	Oenanthe aquatica	Apiaceae	https://observation.org/observation/404466846/
Akkerdoornzaad	Torilis arvensis	Apiaceae	https://observation.org/observation/404354806/
Heggendoornzaad	Torilis japonica	Apiaceae	https://observation.org/observation/404466630/
Artemisia santonicum	Artemisia santonicum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404466746/
Knikkende distel	Carduus nutans	Asteraceae	https://observation.org/observation/404466492/
Wilde cichorei	Cichorium intybus	Asteraceae	https://observation.org/observation/404467009/
Engelse alant	Inula britannica	Asteraceae	https://observation.org/observation/404467042/
Wegdistel	Onopordum acanthium	Asteraceae	https://observation.org/observation/404350028/
Reukeloze kamille	Tripleurospermum inodorum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404466560/
Gewone ossentong	Anchusa officinalis	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404335652/
Veldhondstong	Cynoglossum officinale	Boraginaceae	https://observation.org/observation/404466641/

Pijlkruidkers	Lepidium draba	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404466541/
Doorgroeide kruidkers	Lepidium perfoliatum	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404466806/
Zwanenbloem	Butomus umbellatus	Butomaceae	https://observation.org/observation/404467047/
Grote kaardenbol	Dipsacus fullonum	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404466580/
Slipbladkaardenbol	Dipsacus laciniatus	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404354286/
Avondkoekoeksbloem	Silene latifolia	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404466592/
Akkerwinde	Convolvulus arvensis	Convolvulaceae	https://observation.org/observation/404466478/
Heen	Bolboschoenus maritimus	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404393598/
Valse voszegge	Carex otrubae	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404396244/
Mattenbies	Schoenoplectus lacustris	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404466853/
Glycyrrhiza echinata	Glycyrrhiza echinata	Fabaceae	https://observation.org/observation/404396763/
Duits zoethout	Glycyrrhiza echinata	Fabaceae	https://observation.org/observation/404467008/
Kattendoorn	Ononis spinosa	Fabaceae	https://observation.org/observation/404466633/
Kikkerbeet	Hydrocharis morsus-ranae	Hydrocharitaceae	https://observation.org/observation/404467049/
Stinkende ballote	Ballota nigra	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404335745/
Lycopus exaltatus	Lycopus exaltatus	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404394965/
Bossalie	Salvia nemorosa	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404466599/
Stachys germanica subsp. germanica	Stachys germanica subsp. germanica	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404402426/
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Malvaceae	https://observation.org/observation/404467007/
Limonium gmelini subsp. hungaricum	Limonium gmelini subsp. hungaricum	Plumbaginaceae	https://observation.org/observation/404466733/
Buntgras	Corynephorus canescens	Poaceae	https://observation.org/observation/404466775/
Hordeum hystrix	Hordeum hystrix	Poaceae	https://observation.org/observation/404466815/
Krulzuring	Rumex crispus	Polygonaceae	https://observation.org/observation/404466795/
Valse ridderspoor	Consolida ajacis	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404466861/
Wilde ridderspoor	Consolida regalis	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404466578/
Viltganzerik	Potentilla argentea	Rosaceae	https://observation.org/observation/404336679/

Mottenkruid	Verbascum blattaria	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/404467011/

Gebied: Repashuta

Datum: 12-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae	https://observation.org/observation/404526438/
Groot sterrenscherm	Astrantia major	Apiaceae	https://observation.org/observation/404498234/
Bupleurum longifolium	Bupleurum longifolium	Apiaceae	https://observation.org/observation/404536410/
Kleine bevernel	Pimpinella saxifraga	Apiaceae	https://observation.org/observation/404522796/
Hertswortel	Seseli libanotis	Apiaceae	https://observation.org/observation/404615211/
Doorwaskervel	Smyrnium perfoliatum	Apiaceae	https://observation.org/observation/404539117/
Dalkruid	Maianthemum bifolium	Asparagaceae	https://observation.org/observation/404496476/
Kranssalomonszegel	Polygonatum verticillatum	Asparagaceae	https://observation.org/observation/404536660/

Knikkende distel	Carduus nutans	Asteraceae	https://observation.org/observation/404501921/
Wollige distel	Cirsium eriophorum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404503762/
Muurhavikskruid	Hieracium murorum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404496655/
Dicht havikskruid	Hieracium vulgatum	Asteraceae	https://observation.org/observation/404498445/
Schaduwkruiskruid	Senecio ovatus	Asteraceae	https://observation.org/observation/404498536/
Paardenbloem	Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	Asteraceae	https://observation.org/observation/404503503/
Gele morgenster	Tragopogon pratensis	Asteraceae	https://observation.org/observation/404501981/
Bolletjeskers	Cardamine bulbifera	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404498006/
Draba nemorosa	Draba nemorosa	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404512639/
Damastbloem	Hesperis matronalis	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404498915/
Torenscheefkelk	Pseudoturritis turrita	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404497654/
Torenkruid	Turritis glabra	Brassicaceae	https://observation.org/observation/404509612/
Weideklokje	Campanula patula	Campanulaceae	https://observation.org/observation/404506547/
Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404499228/
Echte valeriaan	Valeriana officinalis	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/404505886/
Kartuizer anjer	Dianthus carthusianorum	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404615225/
Eenjarige hardbloem	Scleranthus annuus	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404510224/
Nachtsilene	Silene nutans	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404502685/
Rode pekanjer	Silene viscaria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404508848/
Grote muur	Stellaria holostea	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/404499491/
Euonymus verrucosus	Euonymus verrucosus	Celastraceae	https://observation.org/observation/404515799/
Geel zonneroosje	Helianthemum nummularium	Cistaceae	https://observation.org/observation/404502483/
Muurpeper	Sedum acre	Crassulaceae	https://observation.org/observation/404517850/
Ruige zegge	Carex hirta	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404514747/
Bleke zegge	Carex pallescens	Cyperaceae	https://observation.org/observation/404519112/
Euphorbia salicifolia	Euphorbia salicifolia	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/404516215/

Bosbingelkruid	Mercurialis perennis	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/404497484/
Wondklaver	Anthyllis vulneraria	Fabaceae	https://observation.org/observation/404514346/
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica	Anthyllis vulneraria subsp. carpatica	Fabaceae	https://observation.org/observation/404616997/
Verfbrem	Genista tinctoria	Fabaceae	https://observation.org/observation/404534508/
Voorjaarslathyrus	Lathyrus vernus	Fabaceae	https://observation.org/observation/404496308/
Bergklaver	Trifolium montanum	Fabaceae	https://observation.org/observation/404507614/
Heggenwikke	Vicia sepium	Fabaceae	https://observation.org/observation/404516593/
Stijve wikke	Vicia tenuifolia	Fabaceae	https://observation.org/observation/404521749/
Kruisbladgentiaan	Gentiana cruciata	Gentianaceae	https://observation.org/observation/404504688/
Donkere ooievaarsbek	Geranium phaeum	Geraniacea e	https://observation.org/observation/404495696/
Iris graminea	Iris graminea	Iridaceae	https://observation.org/observation/404530588/
Siberische lis	Iris sibirica	Iridaceae	https://observation.org/observation/404509176/
Iris variegata	Iris variegata	Iridaceae	https://observation.org/observation/404957328/
Witte veldbies	Luzula luzuloides	Juncaceae	https://observation.org/observation/404496715/
Harig zenegroen	Ajuga genevensis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404507349/
Kruipend zenegroen	Ajuga reptans	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404499661/
Betonie	Betonica officinalis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404530918/
Veldsalie	Salvia pratensis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404502579/
Echte gamander	Teucrium chamaedrys	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404615228/
Grote tijm	Thymus pulegioides	Lamiaceae	https://observation.org/observation/404514146/
Roggelelie	Lilium bulbiferum	Liliaceae	https://observation.org/observation/404521488/
Turkse lelie	Lilium martagon	Liliaceae	https://observation.org/observation/404508365/
Eenbes	Paris quadrifolia	Melanthiaceae	https://observation.org/observation/404500806/
Bleek bosvogeltje	Cephalanthera damasonium	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404541722/
Rood bosvogeltje	Cephalanthera rubra	Orchidaceae	https://observation.org/observation/408290910/
Brede wespenorchis	Epipactis helleborine	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404496363/

Grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404534157/
Vogelnestje	Neottia nidus-avis	Orchidaceae	https://observation.org/observation/404543168/
Walstrobremraap	Orobanche caryophyllacea	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/404502165/
Kleine ratelaar	Rhinanthus minor	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/404516958/
Witte klaverzuring	Oxalis acetosella	Oxalidaceae	https://observation.org/observation/404498161/
Grootbloemig vingerhoedskruid	Digitalis grandiflora	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/404526651/
Ruige weegbree	Plantago media	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/404508171/
Brede ereprijs	Veronica austriaca	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/404520981/
Boskortsteel	Brachypodium sylvaticum	Poaceae	https://observation.org/observation/404500206/
Hondstarwegras	Elymus caninus	Poaceae	https://observation.org/observation/404500472/
Smal fakkelgras	Koeleria macrantha	Poaceae	https://observation.org/observation/404503218/
Bosgierstgras	Milium effusum	Poaceae	https://observation.org/observation/404496113/
Gewoon timoteegras	Phleum pratense	Poaceae	https://observation.org/observation/404615359/
Reuzenzwenkgras	Schedonorus giganteus	Poaceae	https://observation.org/observation/404496186/
Kuifvleugeltjesbloem	Polygala comosa	Polygalaceae	https://observation.org/observation/404509326/
Slanke sleutelbloem	Primula elatior	Primulaceae	https://observation.org/observation/404497301/
Christoffelkruid	Actaea spicata	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404497772/
Struikclematis	Clematis integrifolia	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/408293350/
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404518588/
Wollige boterbloem	Ranunculus lanuginosus	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404500698/
Bosboterbloem	Ranunculus polyanthemos	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404603065/
Geel nagelkruid	Geum urbanum	Rosaceae	https://observation.org/observation/404497005/
Tormentil	Potentilla erecta	Rosaceae	https://observation.org/observation/404531252/
Kleine pimpernel	Poterium sanguisorba	Rosaceae	https://observation.org/observation/404521976/
Meelbes	Sorbus aria	Rosaceae	https://observation.org/observation/404508072/
Wilde lijsterbes	Sorbus aucuparia	Rosaceae	https://observation.org/observation/404498720/

Kalkbedstro	Asperula cynanchica	Rubiaceae	https://observation.org/observation/404511388/
Noords walstro	Galium boreale	Rubiaceae	https://observation.org/observation/404506009/
Boswalstro	Galium sylvaticum	Rubiaceae	https://observation.org/observation/404495611/
Paarse toorts	Verbascum phoeniceum	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/404504591/
Wolfskers	Atropa bella-donna	Solanaceae	https://observation.org/observation/404496264/
Rood peperboompje	Daphne mezereum	Thymelaeaceae	https://observation.org/observation/404500591/
Akkervioolтje	Viola arvensis	Violaceae	https://observation.org/observation/404615364/
Rotsvioolтje	Viola tricolor subsp. saxatilis	Violaceae	https://observation.org/observation/404522040/

Gebied: Hortobagy visvijvers

Datum: 13-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Grof hoornblad	Ceratophyllum demersum	Ceratophyllaceae	https://observation.org/observation/404696170/
Heggenrank	Bryonia dioica	Cucurbitaceae	https://observation.org/observation/404709729/
Valse indigo	Amorpha fruticosa	Fabaceae	https://observation.org/observation/404666957/
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae	https://observation.org/observation/404813423/
Luzerne	Medicago sativa	Fabaceae	https://observation.org/observation/404711727/
Grote wikke	Vicia grandiflora	Fabaceae	https://observation.org/observation/404813682/
Gele wikke	Vicia lutea	Fabaceae	https://observation.org/observation/404703229/
Kikkerbeet	Hydrocharis morsus-ranae	Hydrocharitaceae	https://observation.org/observation/404695685/
Loos blaasjeskruid	Utricularia australis	Lentibulariaceae	https://observation.org/observation/404702504/
Waternoot	Trapa natans	Lythraceae	https://observation.org/observation/404675259/
Heemst	Althaea officinalis	Malvaceae	https://observation.org/observation/404699345/
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Malvaceae	https://observation.org/observation/404694221/

Limonium gmelini subsp. hungaricum	Limonium gmelini subsp. hungaricum	Plumbaginaceae	https://observation.org/observation/404668993/
Handjesgras	Cynodon dactylon	Poaceae	https://observation.org/observation/404675686/
Hordeum hystrix	Hordeum hystrix	Poaceae	https://observation.org/observation/404668427/
Postelein	Portulaca oleracea	Portulacaceae	https://observation.org/observation/404675792/
Gekroesd fonteinkruid	Potamogeton crispus	Potamogetonaceae	https://observation.org/observation/404679394/
Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/404700899/
Grote vlotvaren	Salvinia molesta	Salviniaceae	https://observation.org/observation/404695346/

Gebied: Bukkzserc

Datum: 14-6-2026

Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Kruisdistel	Eryngium campestre	Apiaceae	https://observation.org/observation/406058939/
Asperge	Asparagus officinalis	Asparagaceae	https://observation.org/observation/406059026/
Piramidevogelmelk	Ornithogalum pyramidale	Asparagaceae	https://observation.org/observation/406059030/
Duizendblad	Achillea millefolium	Asteraceae	https://observation.org/observation/406058961/
Slangenkruid	Echium vulgare	Boraginaceae	https://observation.org/observation/406058968/
Nonea pulla	Nonea pulla	Boraginaceae	https://observation.org/observation/406058964/
Pijlkruidkers	Lepidium draba	Brassicaceae	https://observation.org/observation/406058967/
Akkerwinde	Convolvulus arvensis	Convolvulaceae	https://observation.org/observation/406058930/
Zwarte brem	Cytisus nigricans	Fabaceae	https://observation.org/observation/406059001/
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae	https://observation.org/observation/406058926/
Lotus herbaceus	Lotus herbaceus	Fabaceae	https://observation.org/observation/406058944/
Bonte luzerne	Medicago x varia (M. falcata x M. sativa)	Fabaceae	https://observation.org/observation/406058931/
Bont kroonkruid	Securigera varia	Fabaceae	https://observation.org/observation/406058936/
Kranssalie	Salvia verticillata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/406058950/
Bergandoorn	Stachys recta	Lamiaceae	https://observation.org/observation/406058982/

Echte gamander	Teucrium chamaedrys	Lamiaceae	https://observation.org/observation/406058978/
Smal vlas	Linum tenuifolium	Linaceae	https://observation.org/observation/406058976/
Grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea	Orchidaceae	https://observation.org/observation/406059013/
Aangebrande orchis	Neotinea ustulata	Orchidaceae	https://observation.org/observation/406058988/
Purperorchis	Orchis purpurea	Orchidaceae	https://observation.org/observation/406058994/
Walstrobremraap	Orobanche caryophyllacea	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/406058985/
Ruige weegbree	Plantago media	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/406058935/
Polygala major	Polygala major	Polygalaceae	https://observation.org/observation/406058983/
Struikclematis	Clematis integrifolia	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/406059021/
Gewone agrimonie	Agrimonia eupatoria	Rosaceae	https://observation.org/observation/406058932/
Viltganzerik	Potentilla argentea	Rosaceae	https://observation.org/observation/406058934/
Glad walstro	Galium mollugo	Rubiaceae	https://observation.org/observation/406058956/
Geel walstro	Galium verum	Rubiaceae	https://observation.org/observation/406058959/

Gebied: Tiszadob

Datum: 15-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae	https://observation.org/observation/405128975/
Watertorkruid	Oenanthe aquatica	Apiaceae	https://observation.org/observation/405130292/

Varkensvenkel	Peucedanum officinale	Apiaceae	https://observation.org/observation/405264679/
Zijdeplant	Asclepias syriaca	Apocynaceae	https://observation.org/observation/405137699/
Pijpbloem	Aristolochia clematitis	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/405138740/
Alsemambrosia	Ambrosia artemisiifolia	Asteraceae	https://observation.org/observation/405136637/
Artemisia santonicum	Artemisia santonicum	Asteraceae	https://observation.org/observation/405146343/
Kruldistel	Carduus crispus	Asteraceae	https://observation.org/observation/405531871/
Gemaskerde distel	Carduus personata	Asteraceae	https://observation.org/observation/405158695/
Beklierde kogeldistel	Echinops sphaerocephalus	Asteraceae	https://observation.org/observation/405149521/
Wilgalant	Inula salicina	Asteraceae	https://observation.org/observation/405134056/
Akkerkers	Rorippa sylvestris	Brassicaceae	https://observation.org/observation/405153021/
Hop	Humulus lupulus	Cannabaceae	https://observation.org/observation/405138930/
Beemdkroon	Knautia arvensis	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/405149280/
Steenanjer	Dianthus deltoides	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405148174/
Kleine mantelanjer	Petrorhagia saxifraga	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405150455/
Blaassilene	Silene vulgaris	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405128240/
Watermuur	Stellaria aquatica	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405157591/
IJle bermzegge	Carex divulsa	Cyperaceae	https://observation.org/observation/405164232/
IJle zegge	Carex remota	Cyperaceae	https://observation.org/observation/405166974/
Boszegge	Carex sylvatica	Cyperaceae	https://observation.org/observation/405139375/
Heksenmelk	Euphorbia esula	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/405133307/
Euphorbia lucida	Euphorbia lucida	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/405150195/
Hokjespeul	Astragalus glycyphyllos	Fabaceae	https://observation.org/observation/405134838/
Aardaker	Lathyrus tuberosus	Fabaceae	https://observation.org/observation/405131694/
Gewone rolklaver	Lotus corniculatus	Fabaceae	https://observation.org/observation/405128609/
Bont kroonkruid	Securigera varia	Fabaceae	https://observation.org/observation/405128537/

Echt duizendguldenkruid	Centaurium erythraea	Gentianaceae	https://observation.org/observation/405148667/
Genadekruid	Gratiola officinalis	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/405147370/
Boskortsteel	Brachypodium sylvaticum	Poaceae	https://observation.org/observation/405167586/
Duinriet	Calamagrostis epigejos	Poaceae	https://observation.org/observation/405151334/
Bosrank	Clematis vitalba	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/405167713/
Zwarte populier	Populus nigra	Salicaceae	https://observation.org/observation/405148893/
Vederesdoorn	Acer negundo	Sapindaceae	https://observation.org/observation/405164563/
Zwarte toorts	Verbascum nigrum	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/405132232/
Boksdoorn	Lycium barbarum	Solanaceae	https://observation.org/observation/405151404/
Valse Wingerd	Parthenocissus inserta	Vitaceae	https://observation.org/observation/405139051/
Wijnstok	Vitis vinifera	Vitaceae	https://observation.org/observation/405132548/


Gebied: Cserepfalu dal vanaf bezoekerscentrum

Datum: 15-6-2026

Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae	https://observation.org/observation/406059094/
Prachtklokje	Campanula persicifolia	Campanulaceae	https://observation.org/observation/406059106/
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/406059092/
Donderblad	Sempervivum tectorum	Crassulaceae	https://observation.org/observation/406059125/
Hokjespeul	Astragalus glycyphyllos	Fabaceae	https://observation.org/observation/406059123/
Kalkbedstro	Asperula cynanchica	Rubiaceae	https://observation.org/observation/406059116/
Tataarse esdoorn	Acer tataricum	Sapindaceae	https://observation.org/observation/406059101/

Gebied: Kisgyor graslanden

Datum: 16-6-2026




Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Hertekruid	Cervaria rivini	Apiaceae	https://observation.org/observation/405357443/
Sikkelkruid	Falcaria vulgaris	Apiaceae	https://observation.org/observation/405326739/
Heggendoornzaad	Torilis japonica	Apiaceae	https://observation.org/observation/405327636/
Witte engbloem	Vincetoxicum hirundinaria	Apocynaceae	https://observation.org/observation/405340129/
Kuifhyacint	Muscari comosum	Asparagaceae	https://observation.org/observation/405373578/
Piramidevogelmelk	Ornithogalum pyramidale	Asparagaceae	https://observation.org/observation/405349936/
Bruine daglelie	Hemerocallis fulva	Asphodelaceae	https://observation.org/observation/405376756/
Alsemambrosia	Ambrosia artemisiifolia	Asteraceae	https://observation.org/observation/406059161/
Gele kamille	Anthemis tinctoria	Asteraceae	https://observation.org/observation/405361089/
Carduus collinus	Carduus collinus	Asteraceae	https://observation.org/observation/405528439/
Grote centaurie	Centaurea scabiosa	Asteraceae	https://observation.org/observation/405339249/

Inula ensifolia	Inula ensifolia	Asteraceae	https://observation.org/observation/405358438/
Pontechium maculatum	Pontechium maculatum	Boraginaceae	https://observation.org/observation/405362698/
Muurbloemmoster d s.s.	Coincya monensis subsp. cheiranthos	Brassicaceae	https://observation.org/observation/406059196/
Stijve steenraket	Erysimum virgatum	Brassicaceae	https://observation.org/observation/406059198/
Gewone sneeuwbes	Symphoricarpos albus	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/406059157/
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405324541/
Chamaecytisus albus	Chamaecytisus albus	Fabaceae	https://observation.org/observation/405359365/
Brede lathyrus	Lathyrus latifolius	Fabaceae	https://observation.org/observation/405374841/
Lotus conjugatus	Lotus conjugatus	Fabaceae	https://observation.org/observation/406059183/
Sikkelklaver	Medicago falcata	Fabaceae	https://observation.org/observation/405530851/
Alpenklaver	Trifolium alpestre	Fabaceae	https://observation.org/observation/405440941/
Hazenpootje	Trifolium arvense	Fabaceae	https://observation.org/observation/405366280/
Geelwitte klaver	Trifolium ochroleucon	Fabaceae	https://observation.org/observation/405355403/
Grote wikke	Vicia grandiflora	Fabaceae	https://observation.org/observation/405349189/
Sint-Janskruid	Hypericum perforatum	Hypericaceae	https://observation.org/observation/405330734/
Stinkende ballote	Ballota nigra	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405325526/
Betonie	Betonica officinalis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405379127/
Wilde marjolein	Origanum vulgare	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405342228/
Witte brunel	Prunella laciniata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405336109/
Bergandoorn	Stachys recta	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405365984/
Echte gamander	Teucrium chamaedrys	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405338345/
Vijgenboom	Ficus carica	Moraceae	https://observation.org/observation/405336476/
Paarse hengel	Melampyrum nemorosum	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/408283764/
Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/405341903/
Aarereprijs	Veronica spicata	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/406059135/
Veronica spicata subsp. orchidea	Veronica spicata subsp. orchidea	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/405324066/

Bevertjes	Briza media	Poaceae	https://observation.org/observation/405330359/
Duinriet	Calamagrostis epigejos	Poaceae	https://observation.org/observation/405330252/
Wimperparelgras	Melica ciliata	Poaceae	https://observation.org/observation/405341035/
Vedergras	Stipa pennata	Poaceae	https://observation.org/observation/405355533/
Bosrank	Clematis vitalba	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/406059187/
Wilde ridderspoor	Consolida regalis	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/406059165/
Gewone agrimonie	Agrimonia eupatoria	Rosaceae	https://observation.org/observation/405325136/
Kwee	Cydonia oblonga	Rosaceae	https://observation.org/observation/405325803/
Knolspirea	Filipendula vulgaris	Rosaceae	https://observation.org/observation/405332479/
Viltganzerik	Potentilla argentea	Rosaceae	https://observation.org/observation/405331044/
Duinroos	Rosa spinosissima	Rosaceae	https://observation.org/observation/405361271/
Elsbes	Sorbus torminalis	Rosaceae	https://observation.org/observation/405339730/
Melige toorts	Verbascum lychnitis	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/405367798/
Wollige sneeuwbal	Viburnum lantana	Viburnaceae	https://observation.org/observation/405364451/

Gebied: Karstbos

Datum: 16-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae	https://observation.org/observation/421337591/
Hondspeterselie	Aethusa cynapium	Apiaceae	https://observation.org/observation/421337566/
Anthriscus nitidus	Anthriscus nitidus	Apiaceae	https://observation.org/observation/421337506/
Dolle kervel	Chaerophyllum temulum	Apiaceae	https://observation.org/observation/421337568/
Doorwaskervel	Smyrnium perfoliatum	Apiaceae	https://observation.org/observation/421337580/
Gevlekte aronskelk	Arum maculatum	Araceae	https://observation.org/observation/421337510/
Mansoor	Asarum europaeum	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/421337583/
Dalkruid	Maianthemum bifolium	Asparagaceae	https://observation.org/observation/421337573/
Gewone salomonszegel	Polygonatum multiflorum	Asparagaceae	https://observation.org/observation/421337579/
Steenbreekvaren	Asplenium trichomanes	Aspleniaceae	https://observation.org/observation/421337517/
Blaasvaren	Cystopteris fragilis	Aspleniaceae	https://observation.org/observation/421337578/
Ruige leeuwentand	Leontodon hispidus	Asteraceae	https://observation.org/observation/421337534/
Groot springzaad	Impatiens noli-tangere	Balsaminaceae	https://observation.org/observation/421337512/
Klein springzaad	Impatiens parviflora	Balsaminaceae	https://observation.org/observation/421337551/
Haagbeuk	Carpinus betulus	Betulaceae	https://observation.org/observation/421337560/
Haagbeuk	Carpinus betulus	Betulaceae	https://observation.org/observation/421337603/
Hazelaar	Corylus avellana	Betulaceae	https://observation.org/observation/421337561/
Myosotis sparsiflora	Myosotis sparsiflora	Boraginaceae	https://observation.org/observation/421337509/
Ongevlekt longkruid	Pulmonaria obscura	Boraginaceae	https://observation.org/observation/421337572/
Bolletjeskers	Cardamine bulbifera	Brassicaceae	https://observation.org/observation/421337582/
Damastbloem	Hesperis matronalis	Brassicaceae	https://observation.org/observation/421337575/
Wilde judaspenning	Lunaria rediviva	Brassicaceae	https://observation.org/observation/421337556/
Hoge raket	Sisymbrium strictissimum	Brassicaceae	https://observation.org/observation/421337604/
Weideklokje	Campanula patula	Campanulaceae	https://observation.org/observation/421337536/
Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/421337554/


Beemdkroon	Knautia arvensis	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/421337539/
Rode kamperfoelie	Lonicera xylosteum	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/421337567/
Steenanjer	Dianthus deltoides	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/421337548/
Grasmuur	Stellaria graminea	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/421337538/
Grote muur	Stellaria holostea	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/421337588/
Euonymus verrucosus	Euonymus verrucosus	Celastraceae	https://observation.org/observation/421337505/
Herfsttijloos	Colchicum autumnale	Colchicaceae	https://observation.org/observation/421337527/
IJle zegge	Carex remota	Cyperaceae	https://observation.org/observation/421337557/
Boszegge	Carex sylvatica	Cyperaceae	https://observation.org/observation/421337597/
Amandelwolfsmelk	Euphorbia amygdaloides	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/421337570/
Cipreswolfsmelk	Euphorbia cyparissias	Euphorbiaceae	https://observation.org/observation/421337530/
Veldlathyrus	Lathyrus pratensis	Fabaceae	https://observation.org/observation/421337522/
Voorjaarslathyrus	Lathyrus vernus	Fabaceae	https://observation.org/observation/421337574/
Gewone rolklaver	Lotus corniculatus	Fabaceae	https://observation.org/observation/421337542/
Bont kroonkruid	Securigera varia	Fabaceae	https://observation.org/observation/421337541/
Rode klaver	Trifolium pratense	Fabaceae	https://observation.org/observation/421337526/
Beuk	Fagus sylvatica	Fagaceae	https://observation.org/observation/421337563/
Donkere ooievaarsbek	Geranium phaeum	Geraniaceae	https://observation.org/observation/421337581/
Witte veldbies	Luzula luzuloides	Juncaceae	https://observation.org/observation/421337520/
Veelbloemige veldbies	Luzula multiflora	Juncaceae	https://observation.org/observation/421337523/
Gele dovenetel	Lamiastrum galeobdolon	Lamiaceae	https://observation.org/observation/421337585/
Veldsalie	Salvia pratensis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/421337535/
Bosandoorn	Stachys sylvatica	Lamiaceae	https://observation.org/observation/421337594/
Es	Fraxinus excelsior	Oleaceae	https://observation.org/observation/421337511/
Paarse hengel	Melampyrum nemorosum	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/421337508/
Witte klaverzuring	Oxalis acetosella	Oxalidaceae	https://observation.org/observation/421337569/

Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/421337543/
Gewoon reukgras	Anthoxanthum odoratum	Poaceae	https://observation.org/observation/421337532/
Glanshaver	Arrhenatherum elatius	Poaceae	https://observation.org/observation/421337547/
Zachte haver	Avenula pubescens	Poaceae	https://observation.org/observation/421337544/
Bevertjes	Briza media	Poaceae	https://observation.org/observation/421337533/
Boszwenkgras	Festuca altissima	Poaceae	https://observation.org/observation/421337564/
Eenbloemig parelgras	Melica uniflora	Poaceae	https://observation.org/observation/421337586/
Bosgierstgras	Milium effusum	Poaceae	https://observation.org/observation/421337596/
Schaduwgras	Poa nemoralis	Poaceae	https://observation.org/observation/421337576/
Goudhaver	Trisetum flavescens	Poaceae	https://observation.org/observation/421337545/
Eikvaren spec.	Polypodium spec.	Polypodiaceae	https://observation.org/observation/421337515/
Knolboterbloem	Ranunculus bulbosus	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/421337529/
Bosboterbloem	Ranunculus polyanthemos	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/421337571/
Kruisbladwalstro	Cruciata laevipes	Rubiaceae	https://observation.org/observation/421337593/
Noords walstro	Galium boreale	Rubiaceae	https://observation.org/observation/421337524/
Lievevrouwebedstro	Galium odoratum	Rubiaceae	https://observation.org/observation/421337584/
Boswalstro	Galium sylvaticum	Rubiaceae	https://observation.org/observation/421337592/
Spaanse aak	Acer campestre	Sapindaceae	https://observation.org/observation/421337602/
Noorse esdoorn	Acer platanoides	Sapindaceae	https://observation.org/observation/421337590/
Verspreidbladig goudveil	Chrysosplenium alternifolium	Saxifragaceae	https://observation.org/observation/421337514/
Knopig helmkruid	Scrophularia nodosa	Scrophulariaceae	https://observation.org/observation/421337519/
Klokbilzekruid	Scopolia carniolica	Solanaceae	https://observation.org/observation/421337507/
Rood peperboompje	Daphne mezereum	Thymelaeaceae	https://observation.org/observation/421337559/
Groot glaskruid	Parietaria officinalis	Urticaceae	https://observation.org/observation/421337549/
Kruidvlier	Sambucus ebulus	Viburnaceae	https://observation.org/observation/421337601/
Gewone vlier	Sambucus nigra	Viburnaceae	https://observation.org/observation/421337553/

Wollige sneeuwbal	Viburnum lantana	Viburnaceae	https://observation.org/observation/421337599/

Gebied: Tard en dal bij bezoekerscentrum

Datum: 17-6-2026




Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Grote waterweegbree	Alisma plantago-aquatica	Alismataceae	https://observation.org/observation/405584432/
Knolribzaad	Chaerophyllum bulbosum	Apiaceae	https://observation.org/observation/405567192/
Gewone pastinaak	Pastinaca sativa	Apiaceae	https://observation.org/observation/405554965/
Asperge	Asparagus officinalis	Asparagaceae	https://observation.org/observation/405567823/
Carduus defloratus subsp. sumanus	Carduus defloratus subsp. sumanus	Asteraceae	https://observation.org/observation/405559052/
Wollige saffloer	Carthamus lanatus	Asteraceae	https://observation.org/observation/405549208/

Inula ensifolia	Inula ensifolia	Asteraceae	https://observation.org/observation/405700855/
Zuurbes	Berberis vulgaris	Berberidaceae	https://observation.org/observation/405599904/
Gewone smeerwortel	Symphytum officinale	Boraginaceae	https://observation.org/observation/405554050/
Rapunzelklokje	Campanula rapunculus	Campanulaceae	https://observation.org/observation/405570113/
Campanula sibirica	Campanula sibirica	Campanulaceae	https://observation.org/observation/405597531/
Ruig klokje	Campanula trachelium	Campanulaceae	https://observation.org/observation/405598811/
Rode kamperfoelie	Lonicera xylosteum	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/405600599/
Zeepkruid	Saponaria officinalis	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405685524/
Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405559175/
Euonymus verrucosus	Euonymus verrucosus	Celastraceae	https://observation.org/observation/405599378/
Wit vetkruid	Sedum album	Crassulaceae	https://observation.org/observation/405591725/
Donderblad	Sempervivum tectorum	Crassulaceae	https://observation.org/observation/405597985/
Valse voszegge	Carex otrubae	Cyperaceae	https://observation.org/observation/405557908/
Bosbies	Scirpus sylvaticus	Cyperaceae	https://observation.org/observation/405557717/
Ringelwikke	Vicia hirsuta	Fabaceae	https://observation.org/observation/405554907/
Betonie	Betonica officinalis	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405557227/
Phlomis tuberosa	Phlomis tuberosa	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405556615/
Berggamander	Teucrium montanum	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405597808/
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Malvaceae	https://observation.org/observation/405593383/
Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius	Orobanchaceae	https://observation.org/observation/405555579/
Vlasbekje	Linaria vulgaris	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/405748961/
Celtica gigantea	Celtica gigantea	Poaceae	https://observation.org/observation/405562188/
Eenbloemig parelgras	Melica uniflora	Poaceae	https://observation.org/observation/405600369/
Penningkruid	Lysimachia nummularia	Primulaceae	https://observation.org/observation/405584591/
Grote wederik	Lysimachia vulgaris	Primulaceae	https://observation.org/observation/405585384/
Struikclematis	Clematis integrifolia	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/405554317/

Thalictrum lucidum	Thalictrum lucidum	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/405566224/
Weichselboom	Prunus mahaleb	Rosaceae	https://observation.org/observation/405687850/
Groot glaskruid	Parietaria officinalis	Urticaceae	https://observation.org/observation/405746529/

Gebied: Kiskyor beekdal

Datum: 18-6-2026




Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Bergvarkenskervel	Peucedanum oreoselinum	Apiaceae	https://observation.org/observation/405774875/
Pijpbloem	Aristolochia clematitis	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/405774092/
Duitse pijp	Aristolochia macrophylla	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/405781056/
Polygonatum latifolium	Polygonatum latifolium	Asparagaceae	https://observation.org/observation/405783101/
Gewone salomonszegel	Polygonatum multiflorum	Asparagaceae	https://observation.org/observation/405823816/
Grijze vederdistel	Cirsium canum	Asteraceae	https://observation.org/observation/405775209/
Koninginnekruid	Eupatorium cannabinum	Asteraceae	https://observation.org/observation/405774336/
Aardpeer	Helianthus tuberosus	Asteraceae	https://observation.org/observation/405789874/
Muursla	Mycelis muralis	Asteraceae	https://observation.org/observation/405777948/
Zaagblad	Serratula tinctoria	Asteraceae	https://observation.org/observation/405813426/
Boerenwormkruid	Tanacetum vulgare	Asteraceae	https://observation.org/observation/405788957/
Klein springzaad	Impatiens parviflora	Balsaminaceae	https://observation.org/observation/405776820/
Ongevlekt longkruid	Pulmonaria obscura	Boraginaceae	https://observation.org/observation/405787562/
Look-zonder-look	Alliaria petiolata	Brassicaceae	https://observation.org/observation/405776336/
Weideklokje	Campanula patula	Campanulaceae	https://observation.org/observation/405777637/
Prachtklokje	Campanula persicifolia	Campanulaceae	https://observation.org/observation/405779761/
Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/405812996/
Beemdkroon	Knautia arvensis	Caprifoliaceae	https://observation.org/observation/405805902/
Ruige anjer	Dianthus armeria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405775529/
Drienerfmuur	Moehringia trinervia	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405782380/
Zeepkruid	Saponaria officinalis	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405774046/
Prikneus	Silene coronaria	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405784497/
Avondkoekoeksbloem	Silene latifolia	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405814366/
Watermuur	Stellaria aquatica	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/405780381/
Stekelaugurk	Echinocystis lobata	Cucurbitaceae	https://observation.org/observation/405781662/

Bosbies	Scirpus sylvaticus	Cyperaceae	https://observation.org/observation/405807312/
Erwtbladige wikke	Vicia pisiformis	Fabaceae	https://observation.org/observation/405796869/
Ruig hertshooi	Hypericum hirsutum	Hypericaceae	https://observation.org/observation/405798889/
Pitrus	Juncus effusus	Juncaceae	https://observation.org/observation/405814303/
Gewone brunel	Prunella vulgaris	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405819670/
Bosandoorn	Stachys sylvatica	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405799660/
Groot heksenkruid	Circaea lutetiana	Onagraceae	https://observation.org/observation/405785246/
Lange ereprijs	Veronica longifolia	Plantaginaceae	https://observation.org/observation/405807179/
Boskortsteel	Brachypodium sylvaticum	Poaceae	https://observation.org/observation/405775826/
Eenbloemig parelgras	Melica uniflora	Poaceae	https://observation.org/observation/405786788/
Bosgierstgras	Milium effusum	Poaceae	https://observation.org/observation/405784771/
Zwaluwtong	Fallopia convolvulus	Polygonaceae	https://observation.org/observation/405824188/
Waterpeper	Persicaria hydropiper	Polygonaceae	https://observation.org/observation/405782127/
Penningkruid	Lysimachia nummularia	Primulaceae	https://observation.org/observation/405778555/
Struikclematis	Clematis integrifolia	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/405814416/
Moeraswalstro	Galium palustre	Rubiaceae	https://observation.org/observation/405780137/
Boswalstro	Galium sylvaticum	Rubiaceae	https://observation.org/observation/405778663/

Gebied: Rondje vanaf camping

Datum: 19-6-2026



Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Doorwaskervel	Smyrnium perfoliatum	Apiaceae	https://observation.org/observation/406037458/
Mansoor	Asarum europaeum	Aristolochiaceae	https://observation.org/observation/406036856/
Lelietje-van-dalen	Convallaria majalis	Asparagaceae	https://observation.org/observation/406040864/
Blauw parelzaad	Buglossoides purpurocaerulea	Boraginaceae	https://observation.org/observation/406040721/
Kleine wasbloem	Cerinthe minor	Boraginaceae	https://observation.org/observation/406034730/
Alpenklaver	Trifolium alpestre	Fabaceae	https://observation.org/observation/405984053/
Donkere ooievaarsbek	Geranium phaeum	Geraniaceae	https://observation.org/observation/406038185/
Borstelkrans	Clinopodium vulgare	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405960224/
Blauw glidkruid	Scutellaria galericulata	Lamiaceae	https://observation.org/observation/405988957/

Rood bosvogeltje	Cephalanthera rubra	Orchidaceae	https://observation.org/observation/406035166/
Purper nieskruid	Helleborus purpurascens	Ranunculaceae	https://observation.org/observation/406035671/
Wolfskers	Atropa bella-donna	Solanaceae	https://observation.org/observation/406037741/
Pimpernoot	Staphylea pinnata	Staphyleaceae	https://observation.org/observation/406038351/

Gebied: Kisgyor beekdal

Datum: 20-6-2026

Soort naam	Wetenschappelijke naam	Familie	link naar waarneming
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae	https://observation.org/observation/406169057/
Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi	Caryophyllaceae	https://observation.org/observation/406268927/

Bronnen:

- Jávorka Sándor en Csapody Vera(1975). Iconographia florae partis ausstro-orientalis Europae centralis.
- Henning Haeupler, Thomas Muer(2000, 2007). Bildatlas der Farn- und Blutenpflanzen Deutschlands.
- Oliver Tackenberg (2023). Die Flora von Deutschland.
- PADAPT Pannonian Database of Plant Traits https://padapt.eu/en
- Vascular plants of Hungary online database https://floraatlasz.uni-sopron.hu/
- Obsidentify / Observation
- PlantNet
- Waarnemers: Janny Resoort, Willem Drok, Jan van der Veer, Theo Briggeman, Erik Ketting

Vogels

Waargenomen vogelsoorten Hongarije 2008-2026

Naam	2008	2010	2013	2016	2021	2026
Knobbelzwaan	x	x	x	x	x	x
Grauwe Gans	x	x	x		x	x
Kolgans					x	
Bergeend						x
Wilde Eend	x	x	x	x	x	x
Krakeend	x	x	x		x	
Slobeend	x	x			x	
Smient	x				x	x
Zomertaling	x	x	x			
Wintertaling					x	
Tafeleend	x	x	x		x	
Krooneend			x			
Witoogeend		x	x		x	x
Patrijs						x
Fazant	x	x		x	x	x
Kwartel	x	x		x		x
Dodaars	x	x	x	x		x
Fuut	x	x	x			x
Geoorde Fuut	x					
Roodhalsfuut	x		x			
Aalscholver		x	x			x
Dwergaalscholver		x	x	x		x
Roerdomp			x			x
Woudaap		x				x
Kwak	x	x	x			x
Koereiger		x				x
Ralreiger	x	x	x			x
Kleine Zilverreiger		x	x			x
Grote Zilverreiger	x	x	x	x		x
Blauwe Reiger	x	x	x	x		x
Purperreiger	x	x	x	x		x
Ooievaar	x	x	x	x		x
Zwarte Ooievaar	x	x	x			x
Zwarte Ibis		x				
Lepelaar	x	x	x			x
Wespendief	x	x	x	x		x
Zwarte Wouw		x				x
Rode Wouw						x
Visarend					x	
Zeearend	x	x	x		x	x
Schreeuwarend		x	x			x
Keizerarend	x	x		x	x	x
Steenarend		x				
Slangenarend	x	x		x		x
Dwergarend						x
Bruine Kiekendief	x	x	x	x	x	x
Grauwe Kiekendief	x	x	x	x		x
Blauwe Kiekendief	x				x	
Havik	x	x			x	x
Sperwer	x	x	x		x	x
Buizerd	x	x	x	x	x	x
Arendbuizerd						x
Torenvalk	x	x	x	x	x	x
Roodpootvalk	x	x	x		x	x
Boomvalk	x	x	x	x	x	x
Slechtvalk			x			x
Sakervalk	x	x				x

Waterral	x	x	x	x	x	x
Kwartelkoning	x	x	x			
Waterhoen	x	x	x	x	x	x
Klein Waterhoen					x	
Meerkoet	x	x	x	x	x	x
Kraanvogel	x	x	x	x	x	x
Grote Trap	x	x				
Scholekster		x				x
Kluut			x		x	x
Steltkluut						x
Kievit	x	x	x	x		x
Bonte Strandloper	x				x	
Kemphaan					x	
Witgat					x	x
Oeverloper					x	
Watersnip					x	
Tureluur	x	x				x
Groenpootruiter					x	
Zwarte Ruiter	x				x	x
Bosruiter	x					
Grutto		x			x	x
Wulp	x					x
Regenwulp		x				
Kokmeeuw	x	x	x		x	x
Geelpootmeeuw	x		x			
Pontische meeuw		x			x	
Kleine Mantelmeeuw		x				
Visdief	x	x	x	x		x
Witwangstern	x	x	x	x	x	x
Witvleugelstern		x				
Zwarte Stern	x	x		x		
Holenduif	x				x	x
Houtduif	x	x	x	x	x	x
Rotsduif						x
Turkse Tortel	x	x	x	x	x	x
Zomertortel	x	x	x	x	x	x
Koekoek	x	x	x	x	x	x
Ransuil		x	x			x
Velduil					x	
Bosuil	x	x		x		x
Steenuil	x	x	x			x
Oehoe	x	x				x
Oeraluil	x	x				
Nachtzwaluw						x
Gierzwaluw	x	x	x	x		x
Alpengierzwaluw			x			
Hop	x	x	x	x		x
Draaihals	x	x				x
IJsvogel		x			x	x
Bijeneter	x	x	x	x		x
Scharrelaar	x	x	x	x		x
Zwarte Specht	x	x	x			x
Groene Specht	x	x	x	x	x	x
Grijskopspecht	x			x	x	x
Grote Bonte Specht	x	x	x	x	x	x
Syrische Bonte Specht	x			x	x	x
Middelste Bonte Specht	x		x			x
Witrugspecht		x				
Kleine Bonte Specht	x	x		x		x
Boomleeuwerik		x				x
Kuifleeuwerik	x	x	x	x	x	x
Veldleeuwerik	x	x	x	x	x	x

Oeverzwaluw	x	x	x			
Boerenzwaluw	x	x	x	x	x	x
Huiszwaluw	x	x	x	x	x	x
Duinpieper			x			x
Graspieper					x	x
Boompieper	x			x	x	x
Waterpieper						x
Balkankwikstaart			x			
Grote Gele Kwikstaart	x	x		x	x	x
Gele Kwikstaart	x	x		x	x	x
Witte Kwikstaart	x	x	x	x	x	x
Winterkoning	x	x	x	x		x
Grauwe Vliegenvanger	x	x			x	x
Kleine Vliegenvanger						x
Bonte Vliegenvanger				x		x
Withalsvliegenvanger	x	x	x			x
Heggenmus		x				x
Roodborst	x	x	x	x	x	x
Nachtegaal	x	x	x	x		x
Zwarte Roodstaart	x	x	x	x	x	x
Gekraagde Roodstaart	x	x				x
Paapje	x		x		x	x
Roodborsttapuit	x	x	x	x	x	x
Tapuit	x	x		x		x
Merel	x	x	x	x	x	x
Zanglijster	x	x	x	x		x
Grote Lijster		x	x			x
Tuinfluiter	x	x				x
Zwartkop	x	x	x	x		x
Braamsluiper	x	x	x	x		x
Grasmus	x	x	x	x		x
Sperwergrasmus	x	x				x
Rietzanger	x	x	x	x		x
Waterrietzanger	x					
Zwartkoprietzanger						x
Krekelzanger	x					
Snor	x	x	x			x
Kleine Karekiet	x	x	x		x	x
Bosrietzanger	x	x	x			x
Grote Karekiet	x	x	x	x		x
Oostelijke Vale Spotvogel						x
Spotvogel		x				x
Fluiter	x	x		x		x
Tjiftjaf	x	x	x	x	x	x
Fitis		x				x
Goudhaan		x				x
Glanskop	x	x	x	x		x
Kuifmees					x	x
Zwarte Mees	x	x				x
Pimpelmees	x	x	x	x	x	x
Koolmees	x	x	x	x	x	x
Staartmees	x	x		x	x	x
Baardman	x				x	x
Buidelmees		x		x		x
Boomklever	x	x	x	x	x	x
Boomkruiper		x	x			x
Taigaboomkruiper		x				x
Grauwe Klauwier	x	x	x	x	x	x
Roodkopklauwier						x
Klapekster		x			x	x
Kleine Klapekster	x	x	x	x	x	x
Gaai	x	x	x	x	x	x

Ekster	x	x	x	x	x	x
Kauw	x	x	x		x	x
Roek	x	x	x	x	x	x
Bonte Kraai	X	x	x	x	x	x
Zwarte Kraai	x	x				x
Raaf	x	x	x	x	x	x
Spreeuw	x	x	x	x	x	x
Wielewaal	x	x		x		x
Huismus	x	x	x	x	x	x
Ringmus	x	x	x	x	x	x
Vink	x	x	x	x	x	x
Europese Kanarie	x	x	x			x
Groenling	x	x	x	x		x
Putter	x	x	x	x	x	x
Kneu	x	x	x	x		x
Goudvink						x
Appelvink	x	x	x	x	x	x
Rietgors	x	x	x	x		x
Geelgors	x	x	x	x	x	x
Grauwe Gors	x	x	x	x	x	x
Grijze Gors						x
Totaal aantal soorten	**138**	**149**	**112**	**89**	**102**	**166**

Bezoekperiodes:

2008: 21 mei t/m 31 mei
2010: 14 mei t/m 22 mei
2013: 31 mei t/m 17 juni
2016: 25 juni t/m 5 juli
2021: 11 t/m 24 september
2026: 7 juni t/m 21 juni

Vlinders

Tabel dagvlinders Hongarije 2008-2026

Soort	**2008**	**2016**	**2026**
Koningspage	x	x	x
Zuidelijke pijpbloemvlinder	x		x
Koninginnepage		x	x
Zwarte Apollovlinder	**x**		x
Boswitje	x	x	x
Oranjetipje	x		x
Groot Koolwitje		x	x
Klein Koolwitje		x	x
Groot geaderd witje	x		-
Klein geaderd witje	x	x	x
Oostelijk Resedawitje		x	x
Citroenvlinder		x	x
Gele luzernevlinder	x		x
Oranje luzernevlinder	x	x	x
Oostelijke luzernevlinder		x	
Groentje	x	x	x
Eikenpage		x	x
Iepenpage		x	

Wegendoornpage		x	
Kleine sleedoornpage		x	x
Pruimenpage	x		
Bruine eikenpage		x	
Morgenrood		x	
Kleine vuurvlinder	x	x	x
Grote vuurvlinder	x	x	
Bruine vuurvlinder		x	x
Oostelijke vuurvlinder		x	
Violette vuurvlinder	x	x	**x**
Staartblauwtje		x	x
Boomblauwtje		x	x
Dwergblauwtje	x	x	x
Zuidelijk dwergblauwtje		x	
Oostelijk staartblauwtje		x	
Icarusblauwtje	x	x	x
Bloemenblauwtje		x	x
Gentiaanblauwtje		x	
Oostelijke esparcetteblauwtje		x	
Adonisblauwtje		x	x
Klein tijmblauwtje	x		x
Vals Heideblauwtje			x
Klaverblauwtje	x	x	x
Vetkruidblauwtje	x	x	x
Bruin blauwtje		x	x
Kroonkruidblauwtje	x	x	x
Heideblauwtje	x	x	x
Aardbeivlinder	**x**	**x**	x
Kalkgraslanddikkopje			x
Oostelijk Kalkgraslandkopje			x
Bruin dikkopje		x	
Bontdikkopje	**x**		x
Zwartsprietdikkopje		x	x
Geelsprietdikkopje		x	x
Groot dikkopje	x	x	x
Kaasjeskruiddikkopje		x	
Voorjaarsspikkeldikkopje		x	
Groot Spikkeldikkopje		x	
Sleutelbloemvlinder	x	x	x
Snuitvlinder		x	x
Grote Weerschijnvlinder		x	x
Kleine Weerschijnvlinder	x	x	x
Blauwe IJsvogelvlinder		x	
Kleine IJsvogelvlinder		x	x
Lathyruszwever		x	x
Spireazwever		x	x
Dagpauwoog		x	x
Kleine Vos		x	
Grote Vos		x	x
Atalanta	x	x	x
Landkaartje		x	x

Distelvlinder	x	x	x
Gehakkelde aurelia		x	x
Kardinaalsmantel		x	x
Keizersmantel		x	x
Tsarenmantel		x	
Grote Parelmoervlinder	x	x	x
Bosrandparelmoervlinder		x	x
Dubbelstipparelmoervlinder		x	x
Braamparelmoervlinder		x	x
Purperstreepparelmoervlinder		x	x
Zilvervlek			x
Zilveren Maan	x	x	x
Veldparelmoervlinder	x	x	**x**
Knoopkruidparelmoervlinder	x	x	x
Woudparelmoervlinder			x
Toortsparelmoervlinder			x
Bosparelmoervlinder		x	x
Tweekleurige parelmoervlinder		x	x
Paarse parelmoervlinder		x	x
Kleine parelmoervlinder		x	x
Moerasparelmoervlinder			
Roodbonte parelmoervlinder	**x**		
Koevinkje		x	x
Dambordje	x	x	x
Grote Boswachter		x	x
Heivlinder		x	x
Witbandzandoog		x	x
Zomererebia			x
Voorjaarserebia	x		x
Bruin zandoogje		x	x
Roodstreephooibeestje	x	x	x
Hooibeestje	x	x	x
Tweekleurig hooibeestje	x	x	x
Bont Zandoogje		x	x
Argusvlinder	x	x	x
Totaal aantal soorten	**39**	**88**	**82**

2008: periode 21 t/m 31 mei

2016**:** periode 25 juni-5 juli

2026: periode 7 juni – 21 juni

Nachtvlinders 2026

Datum	Nederlandse naam	Latijnse naam	Familienaam	Vindplaats
2026-06-10	Bonte coronamot	Anania stachydalis	Crambidae (grasmotten)	Latorut
2026-06-15	Grasmot onbekend	Crambidae indet.	Crambidae (grasmotten)	Farm Lator
2026-06-10	Maïsboorder	Ostrinia nubilalis	Crambidae (grasmotten)	Latorut
2026-06-10	Parelmoermot	Pleuroptya ruralis	Crambidae (grasmotten)	Latorut
2026-06-08	Grote Beer	Arctia caja	Erebidae (spinneruilen)	Heves

2026-06-09	Hopsnuituil	Hypena rostralis	Erebidae (spinneruilen)	Farm Lator
2026-06-12	Penthophera morio	Penthophera morio	Erebidae (spinneruilen)	Farm Lator
2026-06-08	Phegeavlinder	Amata phegea	Erebidae (spinneruilen)	Latorut
2026-06-09	Plakker	Lymantria dispar	Erebidae (spinneruilen)	Hór-völgy
2026-06-15	Schaduwsnuituil	Herminia tarsicrinalis	Erebidae (spinneruilen)	Farm Lator
2026-06-09	Ethmia pusiella	Ethmia pusiella	Ethmiidae	Hór-völgy
2026-06-10	Appeltak	Campaea margaritaria	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-12	Boterbloempje	Pseudopanthera macularia	Geometridae (spanners)	Bükk-fennsík
2026-06-15	Gele agaatspanner	Gandaritis pyraliata	Geometridae (spanners)	Farm Lator
2026-06-10	Gele agaatspanner	Gandaritis pyraliata	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-10	Gele oogspanner	Cyclophora linearia	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-10	Gevlekte zomervlinder	Comibaena bajularia	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-15	Kl.wegedoornspanner	Philereme vetulata	Geometridae (spanners)	Farm Lator
2026-06-09	Lieveling	Timandra comae	Geometridae (spanners)	Hór-völgy
2026-06-10	Lijnstipspanner	Scopula virgulata	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-09	Nekspindertje	Cyclophora annularia	Geometridae (spanners)	Farm Lator
2026-06-09	Oranje bruinbandspanner	Cidaria fulvata	Geometridae (spanners)	Farm Lator
2026-06-10	Roodbruine walstrospanner	Catarhoe rubidata	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-09	Schaduwspikkelspanner	Peribatodes rhomboidaria	Geometridae (spanners)	Farm Lator
2026-06-12	Vals witje	Siona lineata	Geometridae (spanners)	Farm Lator
2026-06-10	Zuidelijke stipspanner	Idaea trigeminata	Geometridae (spanners)	Latorut
2026-06-10	Akkerwinde-uil	Tyta luctuosa	Noctuidae (uilen)	Heves
2026-06-09	Drielijnuil	Charanyca trigrammica	Noctuidae (uilen)	Farm Lator
2026-06-15	Gewone stofuil	Hoplodrina octogenaria	Noctuidae (uilen)	Farm Lator
2026-06-15	Gewone worteluil	Agrotis exclamationis	Noctuidae (uilen)	Farm Lator
2026-06-09	Groente-uil	Lacanobia oleracea	Noctuidae (uilen)	Farm Lator
2026-06-09	Haarbos	Ochropleura plecta	Noctuidae (uilen)	Farm Lator
2026-06-10	Panteruiltje	Acontia trabealis	Noctuidae (uilen)	Heves
2026-06-11	Vlasbekuiltje	Calophasia lunula	Noctuidae (uilen)	Borsodi
2026-06-09	Grote reuzenzakdrager	Pachythelia villosella	Psychidae (zakdragers)	Farm Lator
2026-06-09	Prachtmot	Oncocera semirubella	Pyralidae (lichtmotten)	Hór-völgy
2026-06-11	Synaphe moldavica	Synaphe moldavica	Pyralidae (lichtmotten)	Borsod-AbaújZemplén
2026-06-10	Triangelmot	Hypsopygia costalis	Pyralidae (lichtmotten)	Latorut
2026-06-08	Kolibrievlinder	Macroglossum stellatarum	Sphingidae (pijlstaarten)	Farm Lator
2026-06-09	Spikkelbladroller spec.	Cnephasia spec.	Tortricidae (bladrollers)	Farm Lator
2026-06-17	Metaalvlinder	Adscita statices	Zygaenidae (bloeddrupjes)	Tard környéki
2026-06-15	Sint-jansvlinder	Zygaena filipendulae	Zygaenidae (bloeddrupjes)	Hór-völgy
2026-06-16	Vijfvlek-sint-jansvlinder	Zygaena trifolii	Zygaenidae (bloeddrupjes)	Kisgyőri

Bijen

Waargenomen soorten bijen 2026

<u>Groefbij soorten Halictinae:</u>		
Lasioglossum leucozonium	matte bandgroefbij	
Lasioglossum sp. 1	groefbij sp. 1	
Lassioglosum brevicorne	kortsprietgroefbij	
Halictus quadricinctus	vierbandgroefbij	
Halictus scabiosae	breedbandgroefbij	
Lasioglossum sp. 2	groefbij sp. 2	
Lasioglossum calceatum	gewone geurgroefbij	
Lasioglossum sp. 3	groefbij 3	
Lasioglossum/Halictus sp 4	groefbij 4	
Lasioglossum/Halictus sp 5	groefbij 5	
Lasioglossum/Halictus sp 6	groefbij 6	
Lasioglossum/Halictus sp 7	groefbij 7	
Lasioglossum/Halictus sp 8	groefbij 8	
Lasioglossum/Halictus sp 9	groefbijtje 9	
Nomiapis diversipes	geen Nederlandse naam	
Seladonia subaurata	goudenbronsgroefbij	
Sytropha curviconis	geen Nederlandse naam	behoort tot de Halictideae
Sphecodes sp.	bloedbij sp.	broedparasiet
<u>houtbij soorten Xylocopinae</u>		
Xylocopa violacea	blauwzwarte houtbij	
Xylocopa valga	zwartspriethoutbij	
Ceratina cyanea	blauwe ertsbij	
Apis mellifera	honingbij	er is maar één honingbij in heel Europa er zijn wel veel rassen
<u>maskerbij Hylaeus soorten:</u>		
Hylaeus sp 1	maskerbij 1	
Hylaeus hyalinatus	tuinmaskerbij	
Hylaeus brevicornus	korsprietmaskerbij	
Hylaeus signatus	resedamaskerbij	
Hylaeus nigritus	composietmaskerbij	
Hylaeus incongruus	weidemaskerbij	
Hylaeus sp 2	maskerbij 2	
<u>Hommel Bombus soorten</u> :		
Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum	aardhommel groep	
Bombus lapidarius	steenhommel	

Bombus pascuroum	akkerhommel	
Bombus sylvestris	vierkleurige koekoekshommel	
Bombus haematurus	Hongaarse hommel	bloedstaart-hommel
Bombus sylvarum ?	boshommel ?	
Bombus hortorum	tuinhommel	
Bombus argillaceus	kleihommel	clay bumble bee
Bombus soroeensis	late hommel	
Bombus hypnorum	boomhommel	
Bombus pratorum	weidehommel	
Bombus ruderatus	grote tuinhommel	
Bombus ruderarius	grashommel	
Bombus sp.1	hommel sp.1	

Zandbij Andrena soorten :

Andrena bicolor	tweekleurige zandbij	
Andrena lathyri	wikkebij	
Andrena curvungula	gewone klokjeszandbij	
Andrena flavipes	grasbij	
Andrena denticulata	kruiskruidzandbij	
Andrena chrysoseles	goudpootzandbij	
Andrena proxima	fluitenkruidbij	
Andrena nitida	viltvlekzandbij	
Andrena nitidiuscula	schermbloemzandbij	
Andrena tarsata	tormentilbij	
Andrena minitula-groep	dwergzandbij groep	
Andrena hattorforiana	knautiabij	
Andrena wilkella	geelstaartklaverzandbij	
Andrena sp 1	zandbij sp. 1	
Andrena sp 2	zandbij sp. 2	

klokjesbij Chelastoma soorten: daar hoort ook de ranonkelbij bij

Chelastoma rapunculi	grote klokjesbij	
Chelastoma florisomme	ranonkelbij	

Langhoornbij soorten:

Eucera longicornis	gewone langhoornbij	
Eucera sp 1	langhoornbij sp. 1	
Eucera sp 2	langhoornbij sp. 2	
Tetralonia alticinta	geen Nederlandse naam	ook wel Tetraloniella

wolbij soorten:

Pseudoanthidium nanum	composietwolbij	
Anthidium manicatum	grote wolbij	
Anthidium septemspinosum	zwartpootwolbij	

metselbij soorten:

Hoplites adunca	slangenkruidbij	
Heriades truncorum	tronkenbij	
Coelioxys conoides	grote kegelbij	broedparasiet

behangersbij/bladsnijder soorten:

Megachile leachella	zilveren fluitje	
Megachille laechella -groep	behangersbij /bladsnijder	
Megachille laechella	geen Nederlandse naam	silvery leafcutter bee
Megachile sp 1	behangersbij 1	
Megachile centuncularis	tuinbladsijder	

Sachembijen Anthophora soorten:

Anthophora furcata	andoornbij
Anthophora quadrimaculata	kattenkruidbij

zijdebijen Colletes soorten:

Colletes daviesanus/fodies/similis	wormkruidbij complex

slobkousbijen Macropis soorten:

Macropis Europaea	gewone slobkousbij

Dikpoot Melitta soorten:

Melitta leporina	klaverdikpoot

en een geheel onbekende soort

Insecten

Libellen

Naam soort	Latijnse naam	
Blauwe breedscheenjuffer	*Platycnemis pennipes*	
Gewone oeverlibel	*Orthetrum cancellatum*	
Kleine roodoogjuffer	*Erythromma viridulum*	
Landtarentje	*Ischnura elegans*	
Zuidelijke keizerlibel	*Anax parthenope*	



Blauwe breedscheenjuffer
Foto: Theo Briggeman

Vliegen en muggen

Naam soort	Latijnse naam
Grote Langlijf	*Sphaerophoria scripta*
Muurrouwzwever	*Anthrax anthrax*
Rosse knobbeldaas	*Hybomitra solstitialis*

Wantsen

Naam soort	Latijnse naam	Familie
Bloedcicade	Cercopis vulnerata	Cercopidae (Bloedcicade
Cercopis intermedia	Cercopis intermedia	Cercopidae (Bloedcicaden)
Streepdijblindwants	Plagiognathus arbustorum	Miridae (Blindwantsen
Horistus orientalis	Horistus orientalis	Miridae (Blindwantsen)

Sprinkhanen en krekels

Naam soort	Latijnse naam	Familie
Bramensprinkhaan	*Pholidoptera griseoaptera*	Acrididae (Veldsprinkhanen)
Kleine goudsprinkhaan	Euthystira brachyptera	Acrididae (Veldsprinkhanen)
Krasser	*Pseudochorthippus parallelus*	Acrididae (Veldsprinkhanen)
Rozevleugel	Calliptamus italicus	Acrididae (Veldsprinkhanen)
Veldkrekel	Gryllus campestris	Gryllidae (Krekels)



Rozevleugel
Foto: Frans Duijm

Kevers

Naam soort	Latijnse naam	Familie
Alpenboktor	Rosalia alpina	
Blinkende prachtkever	*Anthaxia nitidula*	
Dikdijkever	*Oedemera podagrariae*	
Kleine heldenboktor	Cerambyx scopolii	
Klein vliegend hert	*Dorcus parallelipipedus*	
Ladderboktor	Saperda scalaris	
Gele wespenboktor	Plagionotus detritus	
Gladde zakkever	*Clytra laeviuscula*	
Gouden tor	*Cetonia aurata*	
Plagionotus floralis	*Plagionotus floralis*	
Muskusboktor	*Aromia moschata*	
Mylabris spec.	*Mylabris spec.*	
Prionychus spec.	*Prionychus spec.*	
Roodgezoomde goudhaan	Chrysolina sanguinolenta	
Rouwende gouden tor	*Oxythyrea funesta*	
Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje	*Harmonia axyridis f. succinea*	
Vliegend hert	*Lucanus cervus*	



Kleine heldenboktor
Foto: Willem Drok



Muskusboktor
Foto: Theo Briggeman

Zoogdieren overig

- Bruine Rat”
- Edelhert
- Europese Eekhoorn
- Europese Mol
- Europese Bever
- Europese Haas
- Hermelijn
- Ree
- Wezel